

SPOSTAMENTI DEL GABBIANO COMUNE
 LARUS RIDIBUNDUS
 SVERNANTE LUNGO LAMBRO E PO

Giancarlo QUADRELLI

Dal 1972 al 1980, compiendo un censimento semiquantitativo degli uccelli presenti nel territorio di Chignolo Po (PV) situato alla confluenza del Lambro nel Po, ho avuto modo di osservare cospicui spostamenti del Gabbiano comune (*Larus ridibundus*) svernante in gran numero nella zona.

La tabella illustra le variazioni delle presenze di Gabbiani lungo l'anno, calcolate come medie di individui osservati, dal 1972 al 1980, durante escursioni lungo un percorso standard.

Numero medio di Gabbiani comuni osservati per escursione				
<u>dicembre</u>	<u>marzo</u>	<u>giugno</u>	<u>settembre</u>	media annuale
<u>febbraio</u>	<u>maggio</u>	<u>agosto</u>	<u>novembre</u>	
38,7	12,2	0,2	0,8	12,9

Oltre a sporadiche osservazioni a partire dal 1972, ho compiuto rilievi sistematici negli inverni 1979-1980 sugli spostamenti giornalieri dei Gabbiani. Al mattino essi risalgono in gruppetti distanziati il corso del fiume Lambro dirigendosi verso Nord (vedi figura); durante il giorno non sono mai visibili grandi gruppi in spostamento sul fiume. I Gabbiani sono invece presenti nei prati a marcitoia e nei canali di scolo (Redefossi) della periferia di Milano, ove si nutrono. Di sera non ho mai notato concentrazioni di Gabbiani che si trattenessero per dormire nei luoghi di pastura. All'imbrunire i Gabbiani ridiscendono in grandi formazioni a V il fiume Lambro e si riportano sulle spiagge del Po; ho contato fino a 10-12 gruppi di 200-300 esemplari l'uno per un totale di 2000-3600 Gabbiani in spostamento serale.

Arrivato al Po i Gabbiani si spostano in modo diverso: talora sostano per la notte sulle spiagge adiacenti alla foce del Lambro. Il giorno successivo sono rilevabili le tracce della sosta costituite da impronte, deiezioni, borre. Talaltra risalgono per un breve tratto il braccio a monte del meandro posto al

la confluenza Lambro-Po, quindi si dirigono a Sud-Est abbandonando il fiume; tale direzione di volo corrisponde alla posizione di Piacenza. A Piacenza, di sera, ho rilevato gruppi di Gabbiani in volo Ovest Est, che poi si posano nella lanca situata presso il ponte stradale della via Emilia, tra l'isola fluviale e la sponda lombarda del Po. Qui si concentrano in 2000-3000 individui per trascorrere la notte. Questo comportamento è proprio solo dei gruppi svernanti, mentre in primavera-estate il Gabbiano comune è presente solo sul Po, in gruppi di pochi (5-10) individui che si spostano in modo irregolare




Figura 1

In conclusione ritengo che il Gabbiano comune, durante lo svernamento, nel

la zona da me osservata, compia spostamenti quotidiani dal Po fino alla periferia di Milano, risalendo al mattino il fiume Lambro, onde cercare il cibo nelle zone circostanti la metropoli e discendendolo alla sera per concentrarsi sulle spiagge del Po per trascorrere la notte; spesso questo tragitto di ritorno si prolunga fino a Piacenza. In base a personali sporadiche osservazioni, ritengo che anche altri fiumi e canali della zona in esame fungano da direttrice per tali pendolarismi.

Da quanto ho osservato, ritengo che negli ultimi 10 anni, le popolazioni svernanti di Gabbiano comune sono rimaste stabili nella bassa padana. Viceversa il Gabbiano reale (*L. argentatus*) è stato osservato con regolarità solo dal 1978 in avanti, come estivante non nidificante nel tratto di Po in questione; si trattava di individui, in gruppi fino ad un massimo di 6, con prevalenza di immaturi.

SUMMARY

THE BLACK HEADED GULL WINTERING ALONG PO RIVER

The Black Headed Gull *Larus ridibundus* is mainly a winter resident along the Po river, as shown by the relative abundance index in the table (mean no. Gulls seen per standard trip).

From nocturnal roosts, on the Po river banks, flocks of hundreds of Gulls disperse in the morning to feed in the countryside and in irrigation canals. In the study area, the Gulls follow during this dispersal the river Lambro (see figure).

RESUME

LA MOUETTE RIEUSE HIVERNANT SUR LE FLEUVE PO

La mouette rieuse *Larus ridibundus* est surtout espèce hivernante au long du Po, comme est montré par l'index relatif d'abondance dans la table (no. moyen de Mouettes observées par excursion).

Les Mouettes passent la nuit dans des dortoirs situés sur le fleuve Po, et se dispersent le matin pour se nourrir au long des canaux d'irrigation et dans les champs, en suivant, dans la zone considérée, le fleuve Lambro (voir la figure).