

## NUOVI AVVISTAMENTI

Silvano TOSO

*Istituto di Zoologia  
Università di Milano  
Via Celoria 10 - MILANO*

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentali per l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o fuori dai periodi di usuale fenologia.

Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione, l'esistenza di documentazione fotografica.

Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi degli osservatori.

BERTA MINORE, *Puffinus puffinus*, due individui avvistati il 4.8.1980 al largo di Ancona (M. Pandolfi) e diversi esemplari osservati il 10.10.1980 nel porto di Ancona (S. Frugis). Le osservazioni sono probabilmente da riferirsi ad individui provenienti dalle isole della Dalmazia settentrionale o dalle Tremiti.

SULA, *Sula bassana*, 69 avvistamenti dal 17.10.1980 al 19.3.1981 lungo la costa siracusana; 41 individui in abito del I° anno, 17 adulti, 11 intermedi. A Capo Murro di Porco dall'1.12.1980 al 19.3.1981 una media di due avvistamenti per ogni ora di osservazione (C. Iapichino). Questi dati forniscono un'ulteriore conferma della frequenza e regolarità di questa specie al largo delle coste siciliane.

AIRONE GUARDABUOI, *Bubulcus ibis*, due individui osservati il 6.6.1981 nel Parco Uccelli "La Selva" di Palliano (Frosinone), (F. Fraticelli). Questo airone è di passo raro e irregolare nell'Italia peninsulare.

VOLPOCA, *Tadorna tadorna*, 346 individui censiti a Vendicari (Siracusa) il 24.1.1981 (C. Iapichino). Si tratta di un conteggio record per la Sicilia, benchè l'oasi di Vendicari sia una zona di regolare svernamento.

SMERGO MAGGIORE, *Mergus merganser*, 12 individui visti l'8.11.1980 sul fiume Po in località Rea Po (Pavia), (F. Ferlini). Specie di passo scarso anche se relativamente regolare, la sua presenza sul Po e in genere sugli altri fiumi dell'Italia settentrionale è assai meno frequente rispetto a quella osservata sui grandi e medi bacini lacustri.

POIANA CALZATA, *Buteo lagopus*, 1 individuo osservato al Passo della Spugna (Pescara) il 24.2.1979 (M. Pandolfi, S. Frugis). Di comparsa rara e poco regolare nell'Italia settentrionale, questa specie può considerarsi solo occasionale in quella centro-meridionale.

PAVONCELLA, *Vanellus vanellus*, 1 coppia nidificante a Manerbio (Brescia) e alcune coppie nell'entroterra del Lago Superiore di Mantova nella primavera 1981 (P. Bricchetti, D. Cambi). I dati confermano l'espansione dell'areale di nidificazione di questa specie nella parte centrale della Pianura Padana.

GAMBECCHIO NANO, *Calidris temminckii*, 3 individui osservati ripetutamente dal 18.12.1980 al 22.2.1981 a Vendicari (Siracusa), (C. Iapichino). Si tratta del primo dato certo di svernamento in Sicilia.

GAMBECCHIO FRULLINO, *Limicola falcinellus*, 1 individuo visto sul Po di Cremona il 6.9.1981 (F. Maestri). Si tratta di un uccello di ripa di comparsa piuttosto rara e soprattutto irregolare, ma la cui frequenza può essere stata sottovalutata in passato.

AVOCETTA, *Recurvirostra avocetta*, 7 individui avvistati alla foce del Simeto il 4.1.1981, 3 individui alle saline di Augusta il 27.12.1980 e 1 individuo a Vendicari (Siracusa) l'11.1.1981 (C. Iapichino). Sono questi nuovi dati invernali per la specie che aveva già svernato in Sicilia nel 1977-78 (3 individui a Vendicari) e nel 1978-79 (2 individui alla foce del Simeto). E' da notare che l'Avocetta sverna ormai regolarmente in Sardegna.

FALAROPO DI WILSON, *Phalaropus tricolor*, 1 femmina osservata il 14.5.1981 a Casaleggio (Novara) (S. Baratelli). La comunicazione del ritrovamento di questa specie del tutto nuova per l'Italia, corredata da un'ampia documentazione, è stata data il 30.5.1981 ad Aulla nel corso del "I° Convegno Italiano di Ornitologia".

- STERCORARIO MAGGIORE, *Stercorarius skua*, 1 individuo avvistato alla foce del fiume Livenza (Venezia) il 28.9.1980 (F. Mezzavilla). Questa specie è di comparsa accidentale nel Mediterraneo centrosettentrionale.
- STERCORARIO MEZZANO, *Stercorarius pomarinus*, 2 individui adulti in fase chiara osservati nel porto di Livorno il 27.4.1981 (P. Bricchetti, P. Fasce).
- LABBO, *Stercorarius parasiticus*, 1 individuo in fase chiara avvistato il 4.3.1981 a Capo Murro di Porco (Siracusa) (C. Iapichino), 2 individui il 27.4.1981 sul delta del Po in località Goro (M. Ravasini, F. Zanichelli) e 1 individuo l'1.5.1981 nella stessa località (F. Zanichelli). Queste due ultime specie sono di comparsa rara sebbene abbastanza regolare lungo le nostre coste.
- GABBIANO TRIDATTOLO, *Rissa tridactyla*, 1 individuo immaturo a Capo Murro di Porco (Siracusa) il 5.12.1980. Sempre un immaturo era già stato osservato nella stessa località il 2.11.1979 (C. Iapichino). La presenza invernale di questo gabbiano lungo le coste della Sicilia orientale è probabilmente meno irregolare di quanto faccia supporre la scarsità degli avvistamenti.
- UPUPA, *Upupa epops*, 1 individuo osservato a Vendicari (Siracusa) l'8 e l'11.1.1981 (S. Baglieri, C. Iapichino). Si tratta di nuovi dati invernali per la Sicilia (vedi anche Massa, B., 1978, Avocetta, no. 1).
- CUTRETTOLA CAPINERA, *Motacilla flava feldeggii*, 1 individuo osservato il 22.3.1981 alla foce del fiume Tellaro (Siracusa) (C. Iapichino). Per la problematica posta dalla presenza di questa cutrettola in Sicilia si veda Massa, B., 1976, Riv. Ital. Orn. p. 9.
- SORDONE, *Prunella collaris*, 1 individuo osservato nei pressi di Avola (Siracusa) l'1.2.1981 (C. Iapichino). Questa specie è regolare d'inverno nei monti della Sicilia settentrionale, irregolare invece in quella meridionale. Sembra ormai accertato che parte delle popolazioni, un tempo considerate esclusivamente residenti, compia migrazioni regolari, a volte anche in grandi stormi.
- CULBIANCO ISABELLINO, *Oenanthe isabellina*, 1 individuo visto a Capo Murro di Porco il 27.3. e l'1.4.1981 sempre in compagnia di Culbianchi comuni (C. Iapichino). In questa stessa località è stato osservato, per la prima volta in Italia (Baglieri S. 1974, Riv. Ital. Orn., p. 206); negli anni seguenti è stato sempre segnalato durante il passo primaverile.

USIGNOLO D'AFRICA, *Cercotrichas galactotes*, almeno 2 individui osservati il 24. 5.1981 nell'oasi di Bosco di Palo, Ladispoli (Roma) (F. Fraticelli). Di comparsa regolare in Sicilia e nelle isole limitrofe, questa specie è da considerarsi invece accidentale sul continente.

CESENA, *Turdus pilaris*, 30-40 coppie nidificanti nella primavera 1981 a Ponte di Legno (Brescia) ad altezza variabile tra i 1000 e i 1800 m s.l.m. (P. Bricchetti). Si tratta di ulteriori notizie a testimonianza della continua espansione di questa specie sull'arco alpino meridionale.

ZIGOLO DELLE NEVI, *Plectrophenax nivalis*, 1 individuo visto il 17.1.1981 a Capo Murro di Porco (Siracusa) (C. Iapichino). La specie di comparsa rara e irregolare nell'Italia meridionale, è già stata segnalata alcune volte in Sicilia e a Malta.

#### ERRATA CORRIGE

Nuovi avvistamenti - Avocetta 5 (1981).

p. 41 SVASSO CORNUTO, invece di 14 maggio 1980 è 14 gennaio 1980.

p. 43 TOTANO MORO , invece di avvistamento è svernamento.