

ACCERTATA NIDIFICAZIONE DI SVASSO MAGGIORE *PODICEPS CRISTATUS* SUL LAGO DI MANTOVA E NUOVI DATI SULLA DISTRIBUZIONE IN ITALIA

PIERANDREA BRICHETTI
CESARE MARTIGNONI

Gruppo Ricerca Avifauna Nidificante.
Museo Scienze Naturali, via Ozanam 4,
I-25100 Brescia

Il recente accertamento della nidificazione sul Lago Superiore di Mantova (Lombardia), e le nuove notizie raccolte o pubblicate per altre zone, ci inducono ad aggiornare il quadro della distribuzione di questa specie in Italia, descritta da Brichetti (1980). Secondo quanto descritto, lo Svasso maggiore risultava in evidente espansione territoriale e numerica in alcune zone del centro e del Nord, mentre al Sud e in Sardegna la situazione non era favorevole. Le nuove informazioni confermano tale tendenza, certamente favorita da una maggiore tutela ambientale e, soprattutto, dalle recenti restrizioni del calendario venatorio primaverile.

Lombardia: per il Lago Superiore di Mantova non si avevano prove certe di nidificazione dai primi decenni del secolo (Arrigoni degli Oddi 1929), anche se questa importante zona umida era in grado di offrire condizioni favorevoli per la nidificazione (fondali relativamente profondi, abbondante nutrimento, acque poco inquinate, ecc.). Nel 1982 venne scoperto un nido ben celato in una zona con abbondante vegetazione galleggiante, a canneto rado, con fondale costituito da un metro d'acqua e da circa due di fango melmoso; la coppia pescava frequentemente in una zona vicina con fondale più profondo. Il 4 giugno il nido conteneva 4 uova, tutte schiuse entro il 12; la deposizione dovrebbe aver avuto inizio verso il 10 maggio. Vi è da tenere presente che da circa un anno la caccia è stata vietata nella zona.

Per il Lago di Garda la nidificazione è stata accertata dopo oltre 70 anni dall'ultima prova (1906, Duse 1936). Nel 1981 è stata scoperta una colonia di 11 coppie, aumentate a 45 (più alcune altre non lontane) nella stagione successiva (Cambi 1982). Anche qui negli ultimi anni la caccia primaverile si è chiusa in anticipo (fine febbraio).

Per il Varesotto, nel 1979-80 si è notato un incremento numerico nel Lago di Varese (30-40 coppie), con colonizzazione di nuove località e del Lago Maggiore (Realini 1982). Lo stesso si è verificato per tre laghi della Brianza (Pusiano, Annone, Alserio) che, come da notizie raccolte, ospitano complessivamente alcune decine di coppie.

Una coppia ha nidificato nel 1983 sul Po, presso Isola Serafini (Bogliani, com. pers.).

Per l'intera regione la popolazione nidificante è passata dalle 30/40 coppie del 1979 (Brichetti l. c.) alle 110/130 attuali.

Friuli: alcune coppie nidificanti a Marano (Benussi com. pers.).

Toscana: La nidificazione è stata recentemente accertata (1980-81) per due laghi

della Val di Chiana (Lago di Montepulciano e di Chiusi) (Romè 1982).

Campania: Una coppia si è riprodotta nel 1982 nell'Oasi Serre-Persano (Salerno) (Fraissinet com. pers. fonte Kalby e Genovese).




FIGURA 1. Zone di nidificazione dello Svasso maggiore.
La freccia indica il Lago Superiore di Mantova.

Sulla base di queste nuove informazioni, la popolazione complessiva italiana può essere stimata in circa 550/750 coppie nidificanti. Ricerche più approfondite dovranno essere condotte nella fascia costiera dell'alto Adriatico (Veneto), ove esistono notizie storiche o di generica estivazione.

SUMMARY

NEW NESTING RECORD OF GREAT CRESTED GREBE ON MANTOVA LAKE AND DISTRIBUTION AND POPULATION IN ITALY

Nesting of the Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* on the Mantova lake is recorded for the first time since 1906. In Italy this species is currently increasing and expanding its nesting range. The total breeding population may be from 550 to 750 pairs.

Figure 1. Nesting localities of the Great Crested Grebe (last 10 years). The arrow indicates the Mantova lake.

RESUME'

NOUVELLES DONNEES SUR LA NIDIFICATION DE LA GREBE HUPPE'
DANS LE LAC DE MANTOVA, DISTRIBUTION ET POPULATION EN ITALIE

La nidification de la Grebe Huppé *Podiceps cristatus* est confirmée dans le lac de Mantova pour la première fois après la signalisation en 1906. Cette espèce est en expansion et en augmentation en Italie, et la population nicheuse totale est de 550 à 750 couples.

Figure 1. Zones de nidification de la Grebe Huppé en Italie (10 dernières années). La flèche indique le lac de Mantova.

BIBLIOGRAFIA

- ARRIGONI DEGLI ODDI, E. 1929. Ornitologia Italiana. Hoepli, Milano.
- BRICHETTI, P. 1980. Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. I. *Natura Bresciana* 16 (1979): 82-158.
- CAMBI, D. 1982. Nidificazione di Svasso maggiore *Podiceps cristatus* sul Lago di Garda. *Riv. ital. Orn.* 52: 51-54.
- DUSE, A. 1936. Avifauna Benacense. II. *Memorie Ateneo Salò* 7: 48-91.
- REALINI, G. 1982. Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Regione Lombardia, Milano.
- ROME', A. 1982. Osservazioni ornitologiche in Val di Chiana. *Riv. ital. Orn.* 52: 216-218.

Ricevuto maggio 1983