

DUE CASI DI NIDIFICAZIONE DEL MESTOLONE *ANAS CLYPEATA* IN SARDEGNA

GIUSEPPE DELITALA

Istituto di Zoologia
Via Muroni 25 - Sassari

MAURO MARCHETTI

Istituto di Chimica Applicata
Via Vienna 2 - Sassari

Il Mestolone è specie olartica che in Europa nidifica prevalentemente nelle regioni nord-occidentali, mentre nelle regioni centro-meridionali la nidificazione è discontinua e piuttosto localizzata. Il Mestolone non è mai stato riscontrato nidificante in Sardegna (Schenk 1976, Cramp & Simmons 1980, A.A.V.V. 1980, Brichetti & Cambi 1981). Segnaliamo due episodi di nidificazione avvenuti nello stagno del Molentargius presso Cagliari.

La prima osservazione fu compiuta (G.D.) nella terza decade di maggio 1975, nella zona denominata "canale di Terramani". Per circa mezz'ora venne osservata una femmina con sei pulli intenti a cibarsi.

La seconda osservazione avvenne (M.M.) sempre al Molentargius, nella zona detta "Bellarosa minore" il 10 maggio 1981, a poche centinaia di metri dal luogo della prima osservazione: si trattava di una femmina seguita da otto pulcini, che venne anche fotografata.

SUMMARY

FIRST BREEDING RECORDS OF THE SHOVELER *ANAS CLYPEATA* IN SARDINIA

Two cases of breeding by the Shoveler were recorded in Sardinia for the first time, in 1975 and 1981.

RESUME'

PREMIERE SIGNALISATION DE NIDIFICATION DU CANARD SOUCHET *ANAS CLYPEATA* EN SARDAIGNE

Deux couvées furent observées en 1975 et 1981.

BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V. 1980. Gli uccelli. Olympia, Firenze.

BRICHETTI, P. & CAMBI, D. 1981. Uccelli. Rizzoli, Milano

CRAMP, S. & SIMMONS, K.E.L. 1980. The birds of the Western Palearctic. Vol. II. Oxford Univ. Press, Oxford.

SCHENK, H. 1976. Analisi della situazione faunistica in Sardegna. Uccelli e Mammiferi. In: S.O.S. Fauna. World Wildlife Fund, Camerino.

Ricevuto 20 settembre 1983