

NOTIZIE

COLLOQUIO SULL'AVIFAUNA MEDITERRANEA

Il "Groupe de Recherche et d'Information sur les Vertébrés" annuncia un incontro sull'avifauna mediterranea (Montpellier, Francia, 30 novembre e 1 dicembre 1985). Temi proposti: caratteristiche e biogeografia dell'avifauna mediterranea, studi di comunità, studi su particolari specie mediterranee, protezione e conservazione. Per ulteriori informazioni:

G.R.I.V.E.
Laboratoire de Parasitologie Comparée
U.S.T.L.
Place E. Bataillon
34060 Montpellier
Francia

NUOVI AVVISTAMENTI

SILVANO TOSO

Istituto Nazionale della Biologia della Selvaggina
Via Stradelli Guelfi, 23/a
40064 Ozzano Emilia (BO)

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentali per l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o fuori dai periodi di usuale fenologia. Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione e l'esistenza di documentazione fotografica. Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi degli osservatori.

SVASSO COLLOROSSO, *Podiceps griseigena*, 1 individuo in abito giovanile osservato il 23.8.1984 sul Lago di Viverone (Vercelli), (L. Bordignon e L. Cignetti). Le osservazioni di questa specie nelle acque interne italiane sono da considerarsi assai poco frequenti. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 1).

SULA, *Sula bassana*, 1 immaturo del secondo anno rinvenuto stremato e ferito il 30.6.1984 sulla spiaggia di Tonfano-Pietrasanta (Lucca), (A. Voleri e C. Musetti). Ulteriore conferma della presenza anche estiva di questa specie nel Tirreno. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 1 e 2, vol. 7 n. 1).

CICOGNA NERA. *Ciconia nigra*, 1 individuo avvistato il 21.4.1984 in località Monte Cerasolo, Rocca Canterano (Roma), (A. Montemaggiori) e 1 individuo visto il 12.4.1984 in Val ZENA, Monte Formiche (Bologna), (L. Rigacci e M. Bonora). Questa specie è di passo molto scarso anche se relativamente regolare, ma le segnalazioni dalle regioni centrali sono assai poco frequenti. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 4 n. 1, vol. 6 n. 2, vol. 7 n. 1 e vol. 8 n. 1).

SPATOLA, *Platalea leucorodia*, 17 individui osservati il 12 e il 14.4.1984 nelle saline di Trapani (M. Lo Valvo e S. Surdo). L'osservazione di questo Ciconiforme in gruppi così numerosi è un fatto episodico per l'Italia. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 4 n. 1 e vol. 8 n. 1).

FENICOTTERO. *Phoenicopterus ruber*, 6 adulti e 44 subadulti osservati nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 nella Laguna di Orbetello (Grosseto), (M. Gustin); 5 individui subadulti visti il 5.1.1985 nelle saline di Tarquinia (Viterbo), (Bernoni, Di Russo, Gustin) e 1 individuo adulto visto il 9.1.1985 ai Laghi del Circeo (Latina), (Ruvolo). Le osservazioni confermano la accresciuta regolarità dello svernamento di queste specie anche nell'Italia continentale oltre che in Sicilia, con numero crescente di individui. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 1 e col. 7 n. 1).

GALLINA PRATAIOLA, *Tetrax tetrax*, 1 individuo ucciso il 22.2.1984 nei Piani di Lavagna (Genova). (S. Spanò fide S. Podestà). E' ipotizzabile possa trattarsi di un individuo appartenente alla forma orientale considerata di passo molto scarso e relativamente regolare per l'Italia.

OCA SELVATICA, *Anser anser*, 1 individuo della forma occidentale (*anser*) con comportamento da uccello selvatico osservato il 26.7.1984 sul Lago di Viverone (Vercelli), (L. Bordignon e F. Ranchino). Insolita osservazione estiva di una specie data come esclusivamente di passo e invernale per il nostro Paese. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 6 n. 2).

MORIGLIONE. *Aythya ferina*, 10 coppie nidificanti e 19 giovani involati segnalati per la stagione riproduttiva 1983 nel Lago di Pergusa (Enna), (A. Dimarca). La specie ha iniziato a nidificare solo molto recentemente in Sicilia (vedi Dimarca e Falci 1983, Nat. Sic., VII).

QUATTROCCHI, *Bucephala clangula*, 1 femmina osservata il 2.1.1985 sul Lago di Vico (Viterbo), (F. Fraschetti). Questa specie, abbastanza frequente come svernante nell'Italia settentrionale è di comparsa più scarsa e irregolare in quella centrale e meridionale.

SMERGO MAGGIORE, *Mergus merganser*, 3 maschi osservati il 5.12.1984 e 1 maschio l'11.1.1985 presso il litorale di Ostia Lido (Roma), (M. Gustin); 1 individuo in abito giovanile visto l'11.12.1984 dinnanzi al litorale di Macchiatonda (Roma),

(F. Frascchetti). Questa specie compare scarsamente e irregolarmente nell'Italia centro-meridionale nel periodo invernale. (Vedi anche in questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 2).

GOBBO RUGGINOSO, *Oxyura leucocephala*, 1 individuo osservato dall'11 al 18.12.1983 nel Lago Soprano di Serradifalco (Caltanissetta), (A. Dimarca). Un tempo relativamente frequente come svernante nelle zone umide siciliane, questa specie può ora ritenersi accidentale nell'isola (vedi anche Sciacco e Siracusa 1983, *Riv. Ital. Ornit.*, vol. 53 n. 1-2 p. 38).

AQUILA DI MARE, *Haliaeetus albicilla*, 1 individuo immaturo osservato ripetutamente dall'11.12.1984 alla fine dello stesso mese nel territorio del comune di Nonantola (Modena), (E. Selmi). La specie è di passo assai raro ed irregolare, occasionale come svernante e comunque in grave e rapida diminuzione. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 7 n. 1).

FALCO PESCATORE, *Pandion haliaetus*, 1 individuo avvistato il 9.1.1985 alle foci del Fiume S. Giovanni presso Cannigione (Sassari), (F. Germi, C. Morucci e A. Spanò). Conferma della regolarità dello svernamento di questa specie lungo le coste della Sardegna occidentale e settentrionale. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 7 n. 1).

CORRIERE PICCOLO, *Charadrius dubius*, 5 individui osservati il 23 e il 31.12.1984 e 2 individui il 1.1.1985 presso Bentivoglio (Bologna), (D. Bonazzi). La specie sverna in modo irregolare, particolarmente nell'Italia settentrionale. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 7 n.1).

FRATINO, *Charadrius alexandrinus*, 1 individuo osservato il 16.1.1983 e 3 individui osservati dal 11.12.1983 al 26.2.1984 nel Lago di Pergusa (Enna), (A. Dimarca). Le osservazioni sembrano confermare lo svernamento regolare di questo Caradrìde nelle acque interne della Sicilia.

PIVIERE ORIENTALE, *Pluvialis dominica*, 1 individuo osservato il 19.3.1984 in località i Dossi, Casei Gerola (Pavia), (V. Quaglini e E. Tiso). La specie è accidentale per l'Italia ove conta circa 17 segnalazioni.

PAVONCELLA GREGARIA, *Chettusia gregaria*, 1 individuo osservato il 13.5.1984 sul fiume Marecchia in località Corpolò, Rimini (Forlì), (R. Santolini). Questa pavoncella è considerata di comparsa rara ed irregolare nel nostro Paese.

TOTANO MORO, *Tringa erythropus*, 5 individui osservati dal 25.12.1983 al 4.3.1984 nel lago di Pergusa (Enna), (A. Dimarca). La segnalazione conferma lo svernamento della specie in Sicilia anche in zone umide interne. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 1 e vol. 8 n. 1).

FALAROPO BECCOSOTTILE, *Phalaropus lobatus*, 1 femmina in abito estivo vista il 16.6.1984 nella cassa di colmata "A" della Laguna di Venezia (M. Periotto e A. Sartori). Si tratta di una insolita osservazione estiva di questa specie considerata rara anche se relativamente regolare durante i passi. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 4 n. 1).

LABBO, *Stercorarius parasiticus*, 1 giovane in fase scura osservato il 21.9.1984 in località i Dossi, Casei Gerola (Pavia), (E. Tiso e V. Quaglini). La specie è di passo scarso e regolare, ma assai poco frequente nelle acque interne. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 2).

UPUPA, *Upupa epops*, 3 individui osservati il 7.1.1983 e 1 il 5.1.1984 al Biviere di Gela (Caltanissetta) e 1 individuo osservato dal 27.11.1983 al 26.2.1984 a Caltanissetta, (A. Dimarca). Si tratta di nuovi dati che confermano lo svernamento della specie in Sicilia (vedi Massa 1978, *Avocetta* n. 1 e questa stessa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 2).

STERPAZZOLINA, *Sylvia cantillans*, 1 maschio in canto osservato il 10.5.1984 a Casaleone, Legnago (Verona), (M. Pesente). Le osservazioni di questa specie mediterranea a nord del Po sono assai scarse e comunque meritevoli di attenzione. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 7 n. 1).

PIGLIAMOSCHE PETTIROSSO, *Ficedula parva*, 1 femmina osservata ripetutamente tra il 28.8 e il 2.9.1984 a Macherio (Milano), (F. Ornaghi). Si tratta di una specie di comparsa rara anche se relativamente regolare.

GAZZA, *Pica pica*, 1 individuo osservato il 13.8.1983 presso Santa Teresa di Gallura (Sassari), (P. Giordano). L'areale di distribuzione di questa specie non comprende la Sardegna, mentre è stata recentemente segnalata per l'Asinara (vedi Torre e Delitala, 1983 *Avocetta* vol. 7: 37): 1 individuo avvistato il 29.12.1984 al Colle di Se-striere (Torino) all'altitudine di 2.100 metri (L. Borroni). Si tratta di una osservazione al di fuori dell'areale di distribuzione della specie e in un ambiente inconsueto.

STORNO ROSEO, *Sturnus roseus*, 6 individui adulti osservati il 2.6.1984 a Vigliano (Vercelli), (L. Bordignon); alcuni individui segnalati nella prima metà dello stesso mese ai Piani di Lavagna (Genova) e 2 maschi adulti a Carpeneto (Alessandria). (S. Spanò); 3 individui adulti visti il 6.6.1984 a Lemoglio, Moneglia (Genova), (R. Manzi); 1 giovane osservato il 22.10.1984 nell'Oasi "Bosco di Palo", Ladispoli (Roma), (A. Boe e F. Fraticelli). La specie è di comparsa scarsa e irregolare con fenologia caratterizzata da periodiche "invasioni".