

NIDIFICAZIONE DI UNA COPPIA MISTA DI
CODIBUGNOLO AEGITHALOS CAUDATUS

Antonio FACCIN, Bruno DALLE CARBONARE, Giuseppe ZAMBONI

Nelle aree collinari adiacenti alle Prealpi Venete il Codibugnolo è comune, ma finora tutti i soggetti osservati sia nidificanti che svernanti risultarono essere sempre a 'testa striata'. Nel 1980, in comune di Zugliano (Vicenza) a circa 195 m s.l.m., abbiamo rinvenuto il nido di 4 coppie, di cui una composta da un soggetto a 'testa striata' e uno a 'testa bianca'. Il nido della coppia mista fu trovato il 25/2 su una Robinia a circa 5 m dal suolo, in un boschetto di Castagni e Robinie con abbondante sottobosco di Rovi e Noccioli. La costruzione fu completata, almeno esternamente, da entrambi gli adulti. Purtroppo ad una visita successiva, l'1/3, il nido risultava distrutto e il suo materiale sparso sul terreno. Anche gli altri 3 nidi da noi rinvenuti subirono la stessa sorte per cause che non ci è stato possibile determinare.

Il Codibugnolo testa bianca, *Aegithalos c. caudatus* nidifica nell'Europa nordorientale, ma i limiti meridionali del suo areale sono mal definiti. Gli individui a 'testa bianca', che vengono osservati saltuariamente sia d'estate che d'inverno in Europa centrale e occidentale, sono stati ritenuti spesso semplici varianti locali, che comunque sembrano aumentare di frequenza verso nord (Géroudet 1963). Una situazione analoga potrebbe verificarsi anche nell'Italia settentrionale, con una tendenza all'aumento della forma a 'testa bianca' verso nord-est, come indicherebbero le osservazioni relativamente frequenti in Alto Adige (Ortner 1980).

BIBLIOGRAFIA

- GEROUDET, P. 1963. Les Passereaux II. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
ORTNER, P. 1980. Animali delle nostre Alpi. Bolzano, Athesia.



Codibugnolo a testa bianca presso il nido