

## NUOVI AVVISTAMENTI

SILVANO TOSO

Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina  
Via Stradelli Guelfi, 23/A  
40064 Ozzano Emilia (BO)

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentali per l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o fuori dai periodi di usuale fenologia. Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc.. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione e l'esistenza di documentazione fotografica. Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi degli osservatori.

BERTA MINORE, *Puffinus puffinus*, 2-3000 individui avvistati il 24.1.1982 nelle acque antistanti Finale Ligure (Savona), (C. Pulcher). Questa berta, con costumi parzialmente erratici, è relativamente frequente nel medio e basso Tirreno, ma concentrazioni così importanti non sono state sinora segnalate per il Mar Ligure.

PELLICANO, *Pelecanus onocrotalus*, 1 individuo adulto osservato il 27.10.1982 a Capo Murro di Porco (Siracusa), (C. Iapichino). Specie di passo raro e irregolare. La Sicilia, e in particolare la costa sud-orientale, è probabilmente la regione italiana meno raramente frequentata, in particolare durante l'autunno.

SULA, *Sula bassana*, 3 individui (2 immaturi e 1 subadulto) avvistati il 3.7.1982 sulle acque prospicienti il porto di Livorno (C. Carere). Ulteriore conferma della presenza di questa specie nei mari italiani anche nel periodo estivo. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 1 e n. 2).

AIRONE GUARDABUOI, *Bubulcus ibis*, 1 individuo osservato il 29.11.1982 in località Bocca d'Ombro (Grosseto), (F. Corsi). Le osservazioni di questo ardeide, considerato di passo raro e irregolare, si fanno sempre più frequenti anche in Italia a testimonianza dell'incremento numerico e dell'espansione dell'areale che ha caratterizzato questa specie nell'Europa occidentale a partire dagli anni '50. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 5 n. 2 e vol. 6 n. 2).

AIRONE BIANCO MAGGIORE, *Egretta alba*, 1 individuo osservato il 10.10.1982 sul fiume Po a Isola Serafini (Piacenza), (G. Quadrelli). Le osservazioni di questa specie nel settore padano occidentale e centrale sono assai poco frequenti anche durante il passo autunnale.

CICOGNA NERA, *Ciconia nigra*, 1 individuo immaturo osservato l'1.8.1982 sul fiume Sile in località Badoere del comune di Morgano (Treviso), (V. Zampieri). Si tratta di una specie di passo molto scarso anche se relativamente regolare. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 4 n. 1 e vol. 6 n. 2).

FENICOTTERO, *Phoenicopterus ruber*, 1 individuo adulto osservato l'1 e 2. 7.1982 nelle Valli di Comacchio in località Boscoforte, (G. Bogliani, M. Fasola). Il Fenicottero è solo assai sporadicamente presente come estivante nelle zone litorali dell'Italia settentrionale.

FALCO PESCATORE, *Pandion haliaetus*, 1 individuo avvistato il 29.12.1982 sullo stagno di Casaraccio (Sassari), (M. Giustin, M. Bernoni, G. Meo). Un'ulteriore conferma dello svernamento di alcuni individui di questa specie nelle zone umide costiere della Sardegna occidentale.

FALCO PECCHIAIOLO, *Pernis apivorus*, 1 individuo osservato il 27.2.1983 sulle pendici del Monte Berlinghera (Como) (L. Fornasari, G. Micali). Si tratta di una eccezionale presenza invernale di questa specie. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 6 n. 2).

AQUILA DI MARE, *Haliaetus albicilla*, 1 individuo in abito giovanile avvistato il 25.7.1982 sull'isola di Capri presso la Punta Tragara, (L. Sestrieri). La specie è di passo assai raro e irregolare e la sua frequenza in continua diminuzione.

LODOLAIO, *Falco subbuteo*, 1 individuo osservato il 29.12.1982 nel Parco dell'Uccellina (Grosseto), (D. Bonazzi, A. Vigarani). La presenza invernale di questo falco nell'Italia centrale e meridionale merita indagini più approfondite.

SCHIRIBILLA, *Porzana parva*, 1 maschio subadulto osservato il 5.7.1982 sul Lago di Fimon (Vicenza), (E. Cerato, A. Faccin, G. Fracasso). L'osservazione riveste notevole interesse poiché l'areale di distribuzione di questo rallide, assai localizzato come nidificante, non è sufficientemente precisato.

CORRIERE PICCOLO, *Charadrius dubius*, 2 individui osservati il 5.2.1983 sul fiume Brenta presso Pozzalone (Vicenza), (A. Gheller, G. Mezzalana). Specie di passo regolare e localmente estiva e nidificante, ma solo occasionalmente presente durante l'inverno.

PIVIERE TORTOLINO, *Eudromias morinellus*, 1 individuo osservato il 15.10.1982 sul Corno delle Scale (Bologna), (A. Vigarani). Anche per questa specie le osservazioni invernali sono poco comuni.

GABBIANELLO, *Larus minutus*, 4 individui (2 adulti in abito nuziale e due immaturi) osservati il 16.6.1982 sul fiume Po presso Caorso (Piacenza), (G. Bogliani, F.

Barbieri). Questo gabbiano, di passo regolare ed invernale, è da considerarsi occasionale durante i mesi estivi.

GABBIANO TRIDATTOLO, *Rissa tridactyla*, 1 individuo adulto osservato il 18.1.1983 a Somaglia (Milano), (L. Canova). Si tratta di una specie del tutto occasionale per le acque interne italiane, più frequente lungo le coste, in particolare quelle nord-orientali. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 4 n. 2).

MIGNATTINO ALIBIANCHE, *Chlidonias leucopterus*, 2 individui osservati il 5.12.1982 nelle Valli di Comacchio presso Boscoforte (Ferrara), (L. Canova, N. Saino). Questa specie, regolare durante i passi, è da considerarsi accidentale durante l'inverno.

RONDINE DI MARE MAGGIORE, *Hydroprogne tschegrava*, 1 individuo adulto avvistato il 12. 7.1982 sul Lago di Fimon (Vicenza), (G. Fracasso). Si tratta di una interessante osservazione estiva di questa sterna in una zona umida non costiera. (Vedi anche questa rubrica in *Avocetta* vol. 6 n. 2).

RONDONE MAGGIORE, *Apus melba*, 20 individui osservati il 28.9.1982 a Magenta (Milano), (F. Barbieri). La osservazione è decisamente tardiva rispetto alla normale fenologia della specie.

RONDINE MONTANA, *Hirundo rupestris*, circa 20 individui osservati l'11.1.1983 a Iseo (Brescia), (F. Perugini). Una conferma della localizzata presenza invernale di questa specie nella fascia prealpina.

BALESTRUCCIO, *Delichon urbica*, 1 individuo osservato il 20.12.1982 a Capo Murro di Porco (Siracusa), (C. Iapichino). Anche in questo caso si tratta di osservazione particolarmente tardiva pur considerando la localizzazione meridionale.

CANAPINO o CANAPINO MAGGIORE, *Hippolais* sp., 1 individuo osservato il 28.12.1982 sul Lago di Burano (Grosseto), 2 individui il 29.12.1982 nel Parco dell'Uccellina (Grosseto), 1 individuo il 30.12.1982 ad Orbetello (Grosseto), (D. Bonazzi, A. Vigarani). Delle due specie quella che sembra meno occasionale durante la stagione invernale è il canapino maggiore *Hippolais icterina*.

STERPAZZOLINA, *Sylvia cantillans*, 1 maschio in canto osservato il 10.5.1982 a Montecchio Maggiore (Vicenza), (M. Bertacco). Osservazione interessante perché si riferisce ad una regione ove la specie non è confermata come nidificante.

CROCIERE, *Loxia curvirostra*, 2 individui (giovani o femmine) osservati il 16.7. 1982 sull'Isola di Capraia a Vado del Porto, (C. Carere). Una presenza occasionale legata allo spiccato erratismo che caratterizza questa specie.