

NUOVI AVVISTAMENTI

SILVANO TOSO

Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina
Via Stradelli Guelfi, 23/a
40064 Ozzano Emilia (BO)

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territorio italiano, in particolare di specie o sottospecie poco comuni, rare o accidentali per l'avifauna italiana nel complesso, oppure effettuate fuori dall'areale normalmente occupato o fuori dai periodi di usuale fenologia. Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero, età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione, ecc. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione e l'esistenza di documentazione fotografica. Le notizie pervenute verranno vagliate e riportate in forma standardizzata con i nomi degli osservatori.

SVASSO CORNUTO, *Podiceps auritus*, 1 individuo osservato il 6.1.1984 sul Lago di Bracciano (Roma), (M. Bernoni, C. Carere, M. Gustin). Questa specie è di comparsa rara e irregolare durante l'inverno nel nostro Paese e in generale solo un numero assai limitato di individui raggiungono l'area mediterranea. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5 n. 1 e n. 2.

BERTA MAGGIORE, *Procellaria diomedea*, 1 individuo avvistato il 20.8.1983 al largo di Cesenatico (Forlì), (L. Canova e N. Saino). Questa osservazione rappresenta una ulteriore conferma della presenza scarsa, ma piuttosto regolare della specie nelle acque costiere dell'alto Adriatico italiano durante l'estate.

CORMORANO, *Phalacrocorax carbo*, 1 individuo osservato il 30.8.1983 sul fiume Po presso Monticelli (Pavia), (G. Quadrelli). Si tratta di una osservazione decisamente precoce rispetto alla normale comparsa di individui in migrazione autunnale.

AIRONE GUARDABUOI, (*Bubulcus ibis*, 1 adulto in abito nuziale osservato il 5.7.83 nell'oasi di Bosco di Palo, Ladispoli (Roma), (F. Fraticelli). Una nuova testimonianza della comparsa sempre più frequente di questo Ardeide anche nell'Italia peninsulare. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5, n. 2, 6 n. 2 e 7 n. 1.

AIRONE BIANCO MAGGIORE, *Egretta alba*, 1 individuo avvistato il 30.12.1983 presso Zerbolò (Pavia), (N. Saino); 1 individuo il 23.10.1983 sul Po presso Cambiò (Alessandria), (F. Ferlini). La presenza di questa specie è da ritenersi molto scarsa ed irregolare al di fuori delle zone umide costiere dell'alto Adriatico. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 6 n. 2 e 7 n. 1.

SPATOLA, *Platalea leucorodia*, 1 individuo adulto osservato il 30.7.1983 in una lanca del Po presso Carbonara (Mantova), (A. Andreasi) e 1 individuo osservato il 13.3.

1984 nella Lama degli Ontani, San Rossore (Pisa), (M. Apollonio, S. Focardi). La Spatola è considerata specie assai scarsa durante i passi; la prima osservazione testimonia anche di una presenza piuttosto anticipata. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 4 n. 1.

CICOGNA NERA, *Ciconia nigra*, 1 individuo avvistato il 25.4.1983 in Valle Campotto, Argenta (Ferrara), (P. Cardin, R. Pavan e M. Piovesan). Anche questa specie compare in modo irregolare e con un piccolo numero di individui. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 4 n. 1.

AQUILA REALE, *Aquila chrysaetos*, 1 giovane del 2^o o 3^o anno osservato l'11.3.84 in località Cascina Biellese, Roasio (Vercelli), (L. Bordignon). Una ulteriore conferma della presenza sempre più frequente di individui immaturi di questa specie nell'alta pianura piemontese, particolarmente durante i mesi invernali. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 4 n. 1.

GAMBECCHIO FRULLINO, *Limicola falcinellus*, 3 individui osservati l'8.5.1983 nelle saline di Cervia (Ravenna), (R. Tinarelli). Questa specie è considerata di comparsa rara ed irregolare in tutta l'Europa meridionale anche se probabilmente viene sottostimata in conseguenza dei costumi discreti che la caratterizzano e della non facile determinazione in natura. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5 n. 2.

TOTANO MORO, *Tringa erythropus*, circa 450 individui in abito nuziale osservati il 2 e il 4.7.1983 nella Valle Lavadena, Valli di Comacchio (Ravenna), (L. Canova e M. Fasola). Si tratta di una considerevole e rara concentrazione di individui estivi. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5 n. 1.

PITTIMA REALE, *Limosa limosa*, oltre 150 individui osservati il 2 e 4.7.1983 nella Valle Lavadena, Valli di Comacchio (Ravenna) (L. Canova, M. Fasola). Insieme alla osservazione precedente testimonia dell'importanza della parte meridionale delle Valli di Comacchio anche per l'estivazione di alcuni limicoli.

AVOCETTA, *Recurvirostra avocetta*, 1 individuo osservato il 7.1.1984 nella Saline di Tarquinia (Viterbo), (M. Bernoni, C. Carere, M. Gustin) e 1 individuo dal 1 al 4.1984 sul Lago di Fogliano (Latina), (M. Gustin e G. Meo). Le osservazioni invernali di questa specie sono poco frequenti per l'Italia continentale mentre sembrano più regolari per la Sicilia e la Sardegna. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5 n. 2.

STERCORARIO MEZZANO, *Stercorarius pomarinus*, 1 individuo avvistato il 9.9.83 in Adriatico, 40 miglia al largo di Bari (D. Ristow). Questo stercoreario è presente solo con un numero assai piccolo di individui nel Mediterraneo anche se in modo relativamente regolare. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5 n. 2.

RONDINE DI MARE MAGGIORE, *Hydroprogne tschegrava*, 1 individuo adulto os-

servato il 9.7.1983 sul fiume Po 1 Km a monte del ponte della Gerola (Pavia), (E. Vigo) e 1 individuo adulto osservato il 14.8.1983 sulla confluenza tra Adda e Po (Milano), (L. Canova e N. Saino). Queste osservazioni sembrano confermare la presenza piuttosto regolare di questa sterna lungo l'asta del Po come estivante. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 4 n. 1, 6 n. 2 e 7 n. 1.

COLOMBELLA, *Columba oenas*, diverse centinaia di individui osservati ripetutamente da novembre a febbraio 1984 nelle aree protette di Maleo e Somaglia (Milano), (L. Canova e N. Saino). La presenza di un così grande numero di individui di questa specie svernanti in aree ristrette è sicuramente eccezionale, almeno per la Pianura lombarda.

RONDINE, *Hirundo rustica*, 1 individuo osservato il 6.3.1983 a Lambrinia (Pavia), (G. Quadrelli). Una osservazione decisamente anticipata rispetto al normale periodo di arrivo di questa specie nell'Italia settentrionale.

BALESTRUCCIO, *Delichon urbica*, 1 individuo osservato il 6.3.1983 a Lambrinia (Pavia), (G. Quadrelli). Vedi specie precedente. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 7 n. 1.

AVERLA MAGGIORE, *Lanius excubitor*, 1 individuo osservato il 23.12.1983 sul versante nord del Massiccio del Sirente (L'Aquila), (A. Sorace e A. Zocchi). Le osservazioni di questa specie, particolarmente nell'Italia centrale e meridionale, sono ormai sporadiche e irregolari.

CESENA, *Turdus pilaris*, 1 individuo osservato il 1.5.1983 nei pressi del Lago Lungo, Piana di Rieti, (V. Benteriani, M. Brunelli, S. Sarrocco). Questa specie è considerata erratica e sporadicamente estivante nell'Italia centrale; la sua nidificazione è stata più volte ipotizzata ma mai accertata a sud della Toscana. Vedi anche questa rubrica in Avocetta 5 n. 2.

MERLO DAL COLLARE, *Turdus torquatus*, 1 individuo osservato il 29.3.1983 presso la riva settentrionale del Lago di Vico (Viterbo), (C. Moghetti). La presenza del Merlo dal collare nell'Italia centrale e meridionale è scarsa ed irregolare.

ORTOLANO, *Emberiza hortulana*, 8 individui osservati il 8.1.1984 in località Monte Forte, Nurra di Sassari (G. Bogliani e A. Torre). Osservazioni invernali di questa specie, migratrice transahariana, sono da considerarsi assai rare per la penisola ed eccezionali per la Sardegna.