

Nuovi avvistamenti

a cura di EMILIANO ARCAMONE e PIERANDREA BRICHETTI

Questo quarto numero della rubrica *Nuovi avvistamenti* raggruppa numerose interessanti osservazioni che probabilmente sarebbero finite disperse in varie pubblicazioni. Questo grazie anche all'accordo intercorso tra la nostra redazione e quella della Rivista italiana di Ornitologia. Come di consueto facciamo appello alla collaborazione di tutti, soci e lettori, affinché gli avvistamenti di rilevanza nazionale non si perdano in mille rivoli ma confluiscono in questa nostra rubrica recentemente rinnovata.

Le segnalazioni vanno inviate a: Emiliano Arcamone, via Adolfo Tommasi 20/C, 57124 Livorno; e-mail: arcamone@libero.it

Eccezionale concentrazione di Tuffetto *Tachybaptus ruficollis* nel Pantano di Cuba (Sicilia).

A. Corso, C. Cardelli e W. Silvestrini

Un'enorme concentrazione di Tuffetti (2500/3000 ind.) è stata osservata nel Pantano Cuba (SR) tra fine luglio e metà agosto 1998.

* Si tratta probabilmente della più grossa concentrazione di questa specie osservata in Italia in periodo post-ripr. Questa osservazione suggerisce l'importanza del nostro paese come ponte durante la migrazione dei contingenti europei verso le coste nordafricane.

Avvistamento di Svasso cornuto *Podiceps auritus* in Sicilia.

A. Corso, R. Ientile e A. Ciaccio

Dal 29 febbraio al 4 marzo 2000 è stato osservato un ind. in abito invernale all'interno nel porto di Catania.

* Si tratta della settima segnalazione per la Sicilia. La specie compare con meno frequenza al sud d'Italia.

Presenza invernale di Pellicano *Pelecanus onocrotalus* in Puglia.

M. Notarangelo e G. Albanese

Un sub-adulto, probabilmente del 3° anno, è stato osservato il 3 e il 9 dicembre 2000 in volo sui canneti della Daunia Risi (Manfredonia, Foggia). Nella seconda data l'ind. è stato visto allontanarsi dall'area in direzione Sud, ma era di nuovo presente in Daunia Risi durante i censimenti del gennaio successivo. Il soggetto è stato fotografato da S. Laurenti.

* Ancora un'osservazione invernale di questa specie ormai molto rara, abitualmente svernante a Sud del Sahara (cfr. Giannella et al. in Arcamone e Brichetti 1997. *Avocetta* 21: 220; Gennaio e Scarpina in Arcamone e Brichetti 2000. *Avocetta* 24: 59). La presenza nella zona può essere collegata con una situazione trofica particolarmente favorevole, dovuta

al basso livello idrico della zona umida. Nelle poche zone rimaste allagate erano concentrati quantitativi notevoli di pesce (in particolare carpe, *Cyprinus carpio*), determinando effettivi insolitamente alti anche per altre specie di uccelli ittiofagi.

Avvistamenti di Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus* in Puglia e Sicilia.

(1) G. La Gioia

(2) A. Corso, R. Ientile, A. Ciaccio, C. Cardelli

(1) Il 9 ottobre 1999 e il 6 marzo 2000 è stato osservato un ind. in prossimità del Lago Alimini Piccolo (LE). In entrambi i casi si è trattato di adulti in abito non ripr.

La scarsità di osservazioni in provincia di Lecce e la vicinanza dei due punti di osservazione potrebbero far pensare ad un unico ind. svernante.

(2) Da ottobre 1999 a novembre 2000 un immaturo è stato osservato ripetutamente al Lago di Lentini (SR).

* (1) Si conferma la maggiore frequenza della specie in Puglia (Cianchi, Marzano e Panzera in Arcamone e Brichetti 1997. *Avocetta* 21: 220-227). (2) Si tratta della sesta segnalazione per la Sicilia.

Svernamento di Tarabusino *Ixobrychus minutus* in Sicilia.

A. Corso

Tra il novembre 1998 e il 19 febbraio 1999 un maschio è stato osservato ripetutamente alla foce del Fiume Simeto (CT).

* Si tratta del primo caso accertato di svernamento di questa specie in Sicilia ed uno dei pochi per l'Italia. Nella stessa area, in precedenza, erano note solo singole osservazioni invernali (Ciaccio & Priolo 1997. *Natur. sicil.* XXI: 309-413).

Primi casi di svernamento di Nitticora *Nycticorax nycticorax* in Sicilia.

A. Corso, R. Ientile e D. Aliffi

Un gruppo di 12 ind., principalmente immaturi, è stato osservato nella vecchia ansa presso la foce del Fiume Simeto (CT) il 20 dicembre 1998.

* In Italia lo svernamento è piuttosto localizzato (Serra et al., 1991. *Biol. Cons. Fauna* 101: 1-312). Dopo gli avvistamenti al lago di Lentini nel 1997 (Ciaccio & Priolo 1997. *Natur. sicil.* XXI: 309-413), questa osservazione conferma lo svernamento in Sicilia.

Avvistamento invernale di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* nell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

A. Canci

Il 3 gennaio 2000 è stato osservato un ind. in caccia sugli scogli di Punta Bellavista nella parte orientale dell'Isola di Capraia (LI).

* Il continuo incremento numerico della popolazione nazionale spinge la specie in aree dove non era mai stata osservata, anche al di fuori degli ambienti normalmente frequentati.

Avvistamento di Airone schistaceo *Egretta gularis gularis* nella Laguna di Venezia.

G. Cherubini e F. Velatta

Il 14 settembre 2000 è stato osservato un ind. in fase scura nella Cassa di Colmata D/E, nel comune di Mira. È stata notata un'interazione aggressiva con Garzetta *Egretta garzetta*, quest'ultima ha cercato di allontanare il soggetto in questione dal sito di alimentazione, inseguendolo insistentemente.

* Specie accidentale nel Veneto.

Avvistamenti invernali di Airone rosso *Ardea purpurea* in Emilia-Romagna e Toscana

(1) N. Grattini

(2) A. Quagliarini

(1) Il 13 febbraio 2000 un ind. è stato osservato nelle immediate vicinanze del Bosco della Mesola (FE).

(2) Il 5 dicembre 2000 un ind. lungo la riva del Fiume Serchio in loc. Ripafratta (PI). Forse lo stesso soggetto è stato osservato anche il 6 dicembre 2000 nella Bonifica di Vecchiano (PI).

* Osservazioni invernali di questa specie sono estremamente sporadiche. Le osservazioni appaiono rela-

tivamente più frequenti nelle zone umide toscane e dell'alto Adriatico (Grattini in Arcamone e Brichetti 2000. Avocetta 24: 59-65).

Avvistamenti di Cicogna nera *Cicogna nigra* nel Mantovano (Lombardia).

L. Longo

Il 27 marzo 1999 un ind. adulto è stato osservato a lungo in volo sopra la Riserva Naturale di Bosco della Fontana (Marmirolo, MN). Nella stessa località, il 25 agosto 2000, sono strati avvistati sei ind. Il gruppo, composto da due adulti e quattro juv., ha sostato alcune ore nella Riserva, dirigendosi poi verso sud-ovest. * Per la provincia di Mantova si tratta, rispettivamente della settima e ottava segnalazione negli ultimi 15 anni (L. Longo e C. Martignoni, ined.).

Presenze invernali di Cicogna nera *Ciconia nigra* in Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

- (1) N. Grattini e G. Tenedini
- (2) D. Occhiato
- (3) Iapichino, A. Corso, R. Intile, A. Ciaccio, R. Gildi, C. Cardelli e D. Aliffi

(1) Un ind. adulto è stato osservato dall'inizio di gennaio all'inizio di febbraio 2000 nelle campagne presso Novellara (RE). Nella stessa zona il 27 gennaio 1996, sono stati osservati presso un campo coltivato ad erba medica, due adulti insieme a 12 Aironi cenerini *Ardea cinerea*.

(2) Un adulto è stato osservato il 26 dicembre 1998 sul Fiume Arno presso San Giovanni Valdarno (AR), poi involatosi in direzione di Arezzo.

(3) Due piccoli gruppi hanno svernato in Sicilia nell'inverno 1998/99. Tre ind. sono stati osservati allo Stagno di Vendicari (SR) da ottobre a aprile e altri tre al Lago di Lentini (SR), notati in gennaio in compagnia di 5 Cicogne bianche *Ciconia ciconia*.

* Presenze invernali irregolari o occasionali, una decina dal 1990, sono segnalate in Italia (Serra et al. 1991. Biol. Cons. Fauna 101: 1-312).

Si tratta dei primi casi di svernamento accertati in Sicilia, sebbene esistano due osservazioni tardo invernali che hanno fatto pensare ad un possibile svernamento in anni passati (Sorci et al. 1971. Riv. ital. Orn. 41: 61-85; Grussu e Corso 1997. Avocetta 21: 34).

Nuovo caso di svernamento di Mignattaio *Plegadis falcinellus* nella Maremma grossetana (Toscana).

P. Giovacchini

Dall'11 novembre 2000 al 16 febbraio 2001 è stato osservato ripetutamente un adulto nella Palude della Trappola e negli stagni delle Macchiozze, all'interno del Parco della Maremma.

* La specie sverna occasionalmente in Toscana, anche se con maggiore frequenza nella Maremma grossetana (Arcamone in Tellini Florenzano et al. 1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana, 1982-1992. Quad. Mus. St. Nat. Livorno, Monografie 1).

Possibili tentativi di insediamento di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* e di Ibis sacro *Treskiornis aethiopicus* in una garzaia pugliese.

G. Albanese

Un Airone guardabuoi è stato presente almeno dal 15 maggio al 5 giugno 1998 sul filare di eucalipti che ospita attualmente la garzaia della Daunia Risi (Manfredonia, FG); lo stesso sito è stato occupato da 3 ind. nella stagione riproduttiva successiva e di nuovo da un singolo ind. fra il 28 aprile e il 28 maggio 2000. Malgrado indagini condotte continuamente, non si sono mai rinvenuti nidi. La specie ha svernato nell'attigua Bonifica di Siponto soltanto nella stagione 1999-2000 (presenze di 1-3 ind. rilevate ripetutamente tra dicembre e febbraio). L'Ibis sacro è stato notato episodicamente in garzaia il 27 aprile 2000 (2 ind., certamente assenti nei giorni successivi).

* Ancora una testimonianza sull'espansione territoriale di questo ardeide. L'Ibis sacro, di origine non europea, appare in via di naturalizzazione in Italia (Andreotti et al. 2001, Quad. Cons. Natura 2, Min. Ambiente-INFS).

Osservazioni invernali di Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* in Emilia Romagna e Lazio

- (1) D. Bonazzi
- (2) A. Corso, R. Gildi, M. Preziosi e J. Cecere

(1) Tra il 4 e il 25 dicembre 1999 1-2 ind. sono stati osservati in una ex risaia del comune di Bentivoglio

(BO), mentre pascolavano in compagnia di ardeidi nei prati umidi.

(2) Un ind. è stato osservato nel Parco Nazionale del Circeo nel settembre 2000.

* Ancora testimonianze sulla presenza di questa specie alloctona in Italia (si cfr. segnal. precedente).

Avvistamento invernale di un gruppo di Cigno nero *Cygnus atratus* in Friuli-Venezia Giulia.

M. Pratesi e R. Razzi

Il 10 dicembre 2000 è stato osservato nella laguna di Staranzano (UD) un gruppo di cinque ind. Probabilmente si trattava di un gruppo familiare composto da due adulti e tre juv. Questi uccelli si trovavano in compagnia di un branco di circa cinquanta Cigni reali *Cygnus olor*.

* La presenza di questa specie introdotta in Italia è localizzata, anche se iniziano ad essere disponibili indicazioni di insediamento stabile soprattutto per le regioni nord orientali (Andreotti et al. 2001. Quad. Cons. Natura 2, Min. Ambiente-INFS).

Svernamento di Oca lombardella *Anser albifrons* in Puglia.

N. Baccetti, L. Panzarin e S. Laurenti

Nel gennaio 2000, durante i censimenti invernali, sono stati osservate 6 ind. che frequentavano le zone umide della Daunia Risi e di Frattarolo (FG).

* Un tempo abbondante in Puglia come svernante, ai nostri giorni questa specie compare molto raramente, sempre con pochi ind. (Serra et al. 1997. Biol. Cons. Fauna 101:1-312).

Avvistamento di Oca del Canada *Branta canadensis* in provincia di Bologna (Emilia-Romagna).

D. Bonazzi

Il 20 e 21 maggio 2000 è stata osservato un ind. in compagnia di sei Oche selvatiche *Anser anser*. Questo gruppo di oche si trovava in una nuova zona umida artificiale nel comune di Bentivoglio (BO). Il soggetto aveva un comportamento apparentemente selvatico.

* Nel Bolognese esistono ind. semi-domestici immessi localmente. La specie, da tempo naturalizzata in Europa settentrionale, compare con una certa frequenza nell'Italia settentrionale (Andreotti et al. 2001. Quad. Cons. Natura 2, Min. Ambiente-INFS).

Osservazioni invernali di Casarca *Tadorna ferruginea* in Sicilia.

R. Rannisi, C. Iapichino, A. Corso e F. Cilea

Il 1 dicembre 1999 14 ind. in volo sono stati osservati in mare davanti alla foce del Fiume Simeto (CT). Un gruppo di 4 è stato avvistato al Lago di Lentini (SR) il 4 dicembre 1999. Dal 12 al 22 novembre 2000 un ind. ha sostato nello stagno di Vendicari (SR).

* Tra le osservazioni di questa specie registrate nel nostro paese, quelle siciliane appaiono di norma riferibili ad ind. selvatici (Serra et al., 1991. Biol. Cons. Fauna 101: 1-312). Di questi ind. in sosta sull'isola è stata in passato ipotizzata l'appartenenza alla popolazione del Nord-Ovest Africano (Di Carlo, 1977. Gli Uccelli d'Italia 2: 152-170).

Nidificazioni dell'Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris* in Sicilia.

V. Sciabica

Il 6 novembre 1999 due ind. sono stati avvistati ai Gorgi Tondi (TP). Successivamente, il 25 aprile 2000, sono stati osservati 5 ind. con un gruppo di Marzaiola *Anas querquedula* al Pantano Leone (TP), dove dal 2 maggio è stata localizzata 1 coppia nidificante (prima osservazione degli 8 pulli prodotti: 9 giugno). Questi ind. sono progressivamente scomparsi all'apertura della stagione venatoria, ma ne sono stati visti nuovamente nel gennaio 2001. Nella primavera 2011 si sono trattenute al Pantano Leone due coppie.

* Questa specie compare irregolarmente in Sicilia. La nidificazione avvenuta nel 2000 è il primo caso italiano segnalato in questo secolo. Questa osservazione è stata sottoposta all'esame del Comitato Omologazione Italiano. Una documentazione fotografica è stata prodotta in Caccia & Conservazione, IV (3/4): 2-4. Il primo episodio va collegato direttamente alla massiccia invasione avvenuta contemporaneamente nella Tunisia settentrionale (oltre 4000 ind.: TWSG News no. 12: 49-53).

Prima nidificazione di Mestolone *Anas clypeata* in Sicilia.

A. Corso

Nell'agosto 2000 una coppia è stata ripetutamente osservata con 3-4 pulli alle Saline di Priolo (SR).

* Specie sporadica come nidificante nelle regioni centrali e meridionali. Si tratta del primo caso di nidificazione accertato in Sicilia

Avvistamento primaverile di Moretta codona *Clangula hyemalis* a Bocca di Serchio (Pisa).

A. Quaglierini

Dal 29 maggio al 7 giugno 1998 è stato osservato e fotografato un maschio adulto in abito nuziale in prossimità della foce del Fiume Serchio (Vecchiano, Pisa).

* La presenza in Italia di ind. nel periodo primaverile è estremamente scarsa. La data di avvistamento è particolarmente tardiva per le nostre latitudini.

Osservazioni invernali di Nibbio bruno *Milvus migrans* in Emilia-Romagna e Sicilia

(1) D. Bonazzi

(2) A. Corso, C. Cardelli, G. Consoli e S. Baglieri

(1) Dal 13 novembre 1999 al 18 gennaio 2000 è stato osservato un juv. nei pressi di una ex-risaia sita nel comune di Bentivoglio (BO).

(2) Un adulto è stato osservato il 29 dicembre 2000 alle Saline di Siracusa.

* Si tratta del primo caso di svernamento nel Nord-Italia e uno dei pochi casi noti in Sicilia.

Avvistamento di Grifone *Gyps fulvus* nell'Appennino Pavese.

S. Flères e A. Micheli

Il 1° maggio 2001, alle ore 16 circa, durante un'escursione sui primi rilievi dell'Oltrepò pavese, nel comune di Borgoratto Mormorolo (Pavia), è stato osservato per più di un'ora un adulto. Il rapace è apparso in volo sopra la sommità della Costa Pelata (551 m slm), ha volteggiato brevemente sul versante sudoccidentale e, infine, si è posato su una piccola rupe poco eleva-

ta dal pendio. Qui è stato subito preso di mira da numerose cornacchie (*Corvus corone cornix*), che hanno continuato a infastidirlo fino alla fine dell'osservazione. Il piumaggio non mostrava segni artificiali di riconoscimento (depigmentazioni, ecc.).

* La specie è considerata accidentale in Lombardia, con c. 19 segnalazioni; quelle più recenti (ultimi vent'anni) riguardano il Bergamasco: un adulto nel maggio 1988 (Avocetta 1988, 12: 130), un juv. nell'ottobre 1998 (Avocetta 2000, 24: 61) e il Bresciano: un adulto nel maggio 1990 (Natura Bresciana, 33, in stampa). Per la provincia di Pavia è nota solamente una segnalazione del 1872 (Annuar. Scient. R. Ist. Tecn. Pavia 1876-77, II).

Osservazione invernale di Biancone *Circaetus gallicus* in Toscana.

A. Quaglierini

Il 27 dicembre 1999 un ind. è stato osservato nella Bonifica di Vecchiano (PI), nei pressi del lago di Massaciuccoli mentre volteggiava a bassa quota insieme a due Poiane *Buteo buteo*.

* Le osservazioni di questo rapace in periodo invernale sono occasionali (Cattaneo e Brichetti in Brichetti et al. 1992. Fauna d'Italia. Aves I). Probabilmente si tratta della prima segnalazione per la Toscana.

Intenso flusso migratorio di Albanella pallida *Circus macrourus* sullo Stretto di Messina (Sicilia).

A. Corso, D. Ricciardi, A. Giordano, C. Cardelli, S. Celesti, L. Romano, R. Ientile e G. Albarella.

Tra i primi di aprile e la prima metà del maggio 1998 è stato osservato un eccezionale flusso migratorio sullo Stretto di Messina. Sono stati visti oltre 100 ind. (principalmente imm del 2° anno, pochissimi maschi adulti).

* Si tratta probabilmente del maggior numero di ind. osservati in Europa e di uno dei maggiori conteggi del Palearctico Occidentale in meno di due mesi.

Avvistamento invernale di Albanella pallida *Circus macrourus* nella Maremma grossetana (Toscana).

A. Corso, I. Festari, C. Cardelli, L. Ruggieri, O. Janni, e R. Garavaglia

Il 6 dicembre 1999 una femmina è stata osservata al Padule della Diaccia Botrona (Castiglion della

Pescaia,GR). Sostava in un dormitorio in compagnia di numerose Albanelle reali *Circus cyaneus*.

* Probabilmente si tratta del primo avvistamento invernale certo avvenuto in Toscana. La specie sverna saltuariamente in Puglia (Arch. INFS).

Primo avvistamento di Astore *Accipiter gentilis* nel Salento (Puglia).

G. Marzano

Il 24 settembre 2000 in località Arneo (LE) è stato osservato un ind. Il rapace sostava lungo un canale ricco di vegetazione ripariale e grossi alberi. L'area si trova poco distante dal litorale ionico ed è circondata da pinete e macchia mediterranea.

* La presenza di questa specie nel Salento è estremamente rara. L'unica segnalazione in epoche recenti riguarda l'abbattimento di un ind. nella parte meridionale del Salento avvenuta negli anni '70.

Primo avvistamento di Poiana codabianca *Buteo rufinus* in Basilicata

M. Visceglia e M. Francione

Il 4 novembre 1999 è stato osservato un adulto mentre sorvolava l'Oasi WWF del Lago di San Giuliano (Matera).

* Si tratta della prima segnalazione per la Basilicata (Mingozzi in Brichetti et al. 1992. Fauna d'Italia. Aves I). In Italia meridionale l'ultima segnalazione conosciuta (Stretto di Messina a parte) risale al maggio 1993 in Campania (Fraissinet M., 1995. Riv. ital. Orn. 64: 162); nei primi anni '90 venivano osservati con una certa regolarità soggetti svernanti nel Foggiano (Arch. INFS).

Avvistamenti invernali di Poiana calzata *Buteo lagopus* nella fascia costiera della Toscana e del Lazio.

A. Corso, G. Lalli, S. Di Giovanni, D. Ardizzone, C. Cardelli, M. Lausetti e R. Garavaglia.

Un ind. è stato osservato a Orbetello (GR) il 9 dicembre 1997. Un maschio adulto è stato avvistato anche nel Parco Nazionale del Circeo l'8 dicembre 1997.

* Questa specie è tra i rapaci meno frequenti nel nostro paese, ed è particolarmente rara nelle regioni centro-meridionali (Micheli in Brichetti et al. 1992. Fauna d'Italia. Aves I).

Avvistamento di Aquila del Bonelli *Hieräetus fasciatus* in Friuli - Venezia Giulia.

C. Tourenq e T. Bino

L'11 novembre 1999 un immaturo è stato osservato presso Aquileia (UD).

* La data particolarmente tardiva dell'avvistamento fa supporre un movimento di erratismo di un ind. appartenente alla piccola popolazione del Montenegro (Iugoslavia).

Osservazione invernale di Falco pescatore *Pandion haliaetus* nell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

S. Carotti

Un ind. è stato osservato all'Isola di Capraia (LI) il 2 gennaio 2000.

* Specie occasionale in inverno nell'Arcipelago Toscano, ma in aumento nelle zone umide della costa. Negli ultimi anni gli avvistamenti nell'isola di Capraia si sono fatti più frequenti in tutti i periodi dell'anno.

Presenza invernale di Falco cuculo *Falco vespertinus* in Toscana.

A. Quaglierini

Un maschio adulto ha sostato dal 7 al 13 febbraio 2000 nella Bonifica di Vecchiano (PI), in località Corsi.

* La presenza invernale di questa specie in Italia è un fatto occasionale. Sono conosciuti due casi analoghi in Piemonte.

Avvistamento invernale di Lodolaio *Falco subbuteo* in Sicilia.

A. Corso, C. Cardelli e G. Chiofalo

Il 5 gennaio 2000 un ind. adulto è stato osservato in località La Muculufa (CL).

* Si tratta della prima osservazione invernale certa per la Sicilia ed una delle poche italiane.

Avvistamenti di Lanario *Falco biarmicus* in Veneto.

A. Nardo

Il 20 aprile 1997 in località Pradis (VE) ed il 15 dicembre 1999 in località Bonifica di Lisòn (VE), sono stati avvistati in caccia singoli ind. adulti.

* Le osservazioni di questo rapace nel Veneto sono estremamente rare (Foschi 1976. Uccelli d'Italia 1: 97-103).

Avvistamento di Falcone di Barberia *Falco peregrinoides* sullo Stretto di Messina (Sicilia).

A. Corso, D. Ricciardi, A. Giordano, C. Cardelli, R. Ientile, S. Celesti, L. Romano, M. Lenarduzzi e D. Aliffi

Un maschio adulto è stato osservato il 15 aprile 1998 in migrazione sullo Stretto di Messina, in loc. Santa Rosalia (ME).

* Sono note 9 segnalazioni per l'Italia (Brichetti e Truffi in Brichetti e Gariboldi 1999. Manuale di Ornitologia 2). Recenti revisioni di alcuni degli esemplari storici conservati hanno portato a ritenere cinque di queste segnalazioni riferibili a juv. di *Falco peregrinus* (A. Corso, W.S. Clark e D. Forsman ined.).

Nuovo avvistamento di Gallina prataiola *Tetrax tetrax* nella Maremma livornese (Toscana)

E. Arcamone, S. Benucci, R. Ciarla, E. Meschini e P. Poli

Nei mesi di febbraio e marzo 2000 è stata ripetutamente osservata una femmina adulta in loc. la Sterpaia (Piombino, LI), dove nella primavera 1999 fu avvistata un'altra femmina (Gori in Arcamone e Brichetti 2000. Avocetta 24: 59-65). Da informazioni raccolte sembra che questo soggetto avesse svernato nella zona.

* Questo secondo avvistamento nella stessa località appare di difficile spiegazione. Non è da escludere che si tratti dello stesso ind. che è riuscito a sopravvivere nella zona. L'appartenenza dei soggetti alla popolazione sarda sembra molto dubbia.

Notevole concentrazione di Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* nel Siracusano (Sicilia) durante la migrazione post-riproduttiva.

A. Corso, G. Terranova, C. Cardelli e C. Iapichino.

Da metà luglio a metà agosto 1998 sono stati osservati negli Stagni di Longarini e Cuba (Siracusa) oltre 2500 ind.

* Si tratta sicuramente di un record numerico assoluto per l'intero paese.

Primo caso di svernamento di Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* in Toscana.

P. Dall'Antonia

Il 16 gennaio 2000, durante i censimenti invernali degli uccelli acquatici, in loc. Stagnino, nella Laguna di Orbetello (GR), è stato osservato un ind., in compagnia di un gruppo misto di limicoli.

* Si tratta della prima segnalazione invernale della specie.

Primi casi di svernamento di Corriere piccolo *Charadrius dubius* in Emilia-Romagna.

D. Bonazzi

Nel periodo compreso tra il 17 novembre 2000 ed il 15 gennaio 2001, sono stati ripetutamente osservati alcuni ind. (min. 1, max. 11) sostare nelle vasche prosciugate di un allevamento ittico, in prossimità delle ex-risaie del comune di Bentivoglio (BO). Nell'inverno 1984-85, nella stessa località e ambiente erano stati osservati da 1 a 5 ind.

* La specie non era conosciuta come svernante in Emilia-Romagna (Serra et al. 1997. Biol. Cons. Fauna 101: 1-312). Si tratta del sito italiano di svernamento più settentrionale.

Osservazioni di Piviere tortolino *Charadrius morinellus* in Toscana.

- (1) A. Quaglierini
- (2) P. Giovacchini

(1) Il 31 ottobre 1999 due ind. sono stati osservati nella Bonifica di Vecchiano (PI). Nella stessa loca-

lità, il 6 novembre successivo, sono stati osservati tre ind.

(2) Il 23 maggio 2000 sono stati osservati due ind. in prossimità della foce del Fiume Ombrone.

* Le notizie sulla migrazione di questa specie sono scarse e frammentarie. Questi avvistamenti testimoniano il permanere di un flusso migratorio di questo pioviero lungo il litorale toscano, come già noto agli autori del passato.

Uno stormo record di Pioviero tortolino *Charadrius morinellus* nel Veneto orientale.

L. Panzarin

Ben 48 ind. (46 juv. e 2 ad.) sono stati osservati in sosta su un campo nelle bonifiche di Valle Vecchia (Caorle, VE) il 6 settembre 2000.

Le dimensioni di questo stormo in sosta migratoria sono decisamente insolite e non hanno riscontro in Italia almeno in anni recenti.

Primo svernamento di Piovanello maggiore *Calidris canutus* in Toscana.

(1) N. Baccetti, G. Battaglia, P. Dall'Antonia, S. Romano e M. Zenatello

(2) A. Corso, A. Laurenti e L. Ruggieri

(1) Il 17 gennaio 1999 nella Laguna di Ponente di Orbetello (GR), durante il censimento invernale degli uccelli acquatici, sono stati osservati 2 ind. Sempre nello stesso sito il 16 gennaio 2000, il totale rilevato durante il censimento era di 5 ind., distribuiti contemporaneamente nell'Oasi WWF (3) e nella zona di Stagnino (2). Lo svernamento si è anche ripetuto nella stagione successiva, con 4 ind. tutti rilevati all'interno della nuova cassa di colmata di Fosso Pucci il 14 gennaio 2001. I soggetti osservati nel 2000 erano prevalentemente immaturi.

(2) Dall'inizio di dicembre 1999 a fine gennaio 2000 sono stati osservati fino a 10 ind. nella Laguna di Ponente di Orbetello (GR).

* La specie sverna nel nostro paese in poche località dell'alto Adriatico, della Sardegna e irregolarmente della Puglia (Baccetti et al. 1996. WSG Bull. 80: 39-40). Si tratta dei primi casi di svernamento in Toscana; il fenomeno potrebbe sembrare in via di consolidamento.

Avvistamento di Piro piro pettorale *Calidris melanotos* in Sicilia.

A. Corso, C. Cardelli e G. Terranova

Un juv è stato osservato al Pantano Longarini (SR) il 19 luglio 1998.

* Si tratta dell'11° segnalazione italiana, l'ultima delle quali è avvenuta agli stagni del Circeo (Trotta, 1997. Avocetta 21: 222-223).

Consistente gruppo di Albastrelli *Tringa styagnatilis* nel Siracusano (Sicilia) durante la migrazione post-riproduttiva

A. Corso, G. Terranova e C. Cardelli

Il 2 agosto 1998 un gruppo di oltre 150 ind. si trovava negli Stagni di Longarini e Cuba.

* Si tratta di una concentrazione insolita per la zona, dato che in Italia numeri simili vengono rilevati abitualmente solo in alcune zone umide dell'alto Adriatico.

Avvistamento di Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* in Toscana.

D. Occhiato

Il 3 maggio 1998, durante una giornata d'intenso passo di limicoli nella Piana Fiorentina (FI), è stato osservata una femmina in abito ripr.

* Anche se si tratta della specie più comune tra i Falaropi, è comunque da considerarsi molto scarsa, soprattutto in periodo primaverile.

Avvistamenti di Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* in Sicilia.

A. Corso, C. Iapichino e C. Cardelli

Un adulto ed un immaturo del 2° anno sono stati osservati rispettivamente il 23 marzo e il 21 ottobre del 1998 alla Foce del Fiume Simeto (CT). Un juv. è stato osservato il 26 ottobre 1998 a Capo Murro di Porco (SR). Nella stessa località il 14 dicembre 1999 è stato osservato un adulto in abito invernale.

* Si tratta dello stercorario meno frequente nei mari

italiani. Le segnalazioni sono più numerose nelle regioni interne settentrionali. Specie accidentale in Sicilia, con 6 segnalazioni.

Avvistamento di Mugnaiaccio *Larus marinus* al porto di Catania (Sicilia).

A. Ciaccio

Il 2 dicembre 1998 un adulto è stato osservato nel porto di Catania.

* Si tratta del 1° avvistamento certo per la Sicilia.

Avvistamento di Sterna del Rüppell *Sterna bengalensis* in Sicilia.

A. Corso, R. Ientile, G. Consoli e G. Terranova

Un adulto in abito ripr. è stato osservato il 6 luglio 1998 alle Saline di Siracusa.

* Si tratta dell'8° segnalazione per la Sicilia.

Osservazione di Sterna codalunga *Sterna paradisea* in Sicilia.

A. Corso e R. Ientile

Un adulto in abito ripr. è stato osservato il 12 luglio 1998 alle Saline di Siracusa.

* Si tratta dell'11° segnalazione per l'Italia e della terza siciliana.

Svernamento di Mignattino *Chlidonias niger* sul Lago di Garda (Lombardia).

A. Gargioni e A. Rossi

Un adulto era presente dal 23 gennaio al 20 febbraio 2000 lungo la penisola di Sirmione, dove frequentava per motivi trofici principalmente l'area di un porticciolo.

* La specie sverna irregolarmente soprattutto lungo le coste marine delle regioni meridionali, più scarsamente in quelle settentrionali e occasionalmente nell'interno. Per la Lombardia è il primo caso accertato di svernamento.

Osservazioni invernali di Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* nel Lago Trasimeno (Umbria).

F. Velatta e M. Muzzatti

Il 6 gennaio 1998 ed il 13 gennaio 2000 sono stati osservati singoli ind. di questa specie volteggiare sopra il Lago Trasimeno, rispettivamente a Castiglione del Lago e Magione.

* La specie è da considerarsi accidentale come svernante. È noto per l'Italia un solo caso di svernamento, sempre in Umbria (Laurenti 1995. Suppl. Ric. Biol. Selvagg. XXII: 651).

Primo caso di svernamento di Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus* in Italia.

A. Corso e W. Silvestrini

Un adulto, stranamente ancora in abito estivo, è stato osservato alle Saline di Siracusa (Sicilia) il 15 gennaio 1996.

* Si tratta del primo caso di svernamento segnalato per il nostro paese.

Avvistamenti di Gazza marina *Alca torda* nello Stretto di Messina.

L'11 febbraio 2000 3 ind. sono stati visti transitare da Torre Faro, Ganzirri (ME) sullo Stretto di Messina da ovest/nord-ovest verso est/sud-est. Un altro ind. è stato osservato nello stesso sito il 25 aprile con lo stesso comportamento.

* La specie compare molto irregolarmente al Sud. Le segnalazioni siciliane sono circa una ventina.

Osservazione tardiva di Cuculo *Cuculus canorus* in Toscana.

A. Quaglierini

Un ind. è stato osservato il 7 e il 14 novembre 1999 in un oliveto della Fattoria della Traversagna, nella Bonifica di Vecchiano (PI).

* Occasionale segnalazione autunnale. Un ind. è stato osservato in inverno nel 1994 in Lombardia (Dotti e Pavia, in Arcamone e Brichetti 1997. Avocetta 21: 229).

Prima osservazione di Picchio rosso mezzano *Dendrocopos medius* in provincia di Venezia.

L. Panzarin

Un ind. è stato osservato in 5 occasioni tra il 18 novembre 2000 e il 7 gennaio 2001 nella prima periferia di Torre di Mosto (VE). Durante le osservazioni il soggetto si spostava tra un pioppeto dell'età di otto anni (circa 4000 mq) e un piccolo vivaio di latifoglie autoctone, distante circa 300 m.

* Si tratta della prima segnalazione in provincia di Venezia, dovuta verosimilmente ad un movimento erratico dalla vicina Slovenia, dove questo picide si riproduce a breve distanza dal confine italiano (Geister 1995. Ornitolo.ki atlas Slovenije. DSZ). Nonostante il suo areale di nidificazione contorni per buona parte l'arco alpino, il Picchio rosso mezzano è specie di comparsa accidentale in tutta l'Italia settentrionale. Le rare segnalazioni a nord della pianura Padana risalgono tutte ai primissimi anni del '900 (cfr. AA.VV. 1985. Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto. Regione Veneto; Foschi et al. 1996. Ric. Biol. Selv. 97: 1-311; Parodi 1999. Gli uccelli della Provincia di Gorizia. Mus. Friul. St. Nat., Pubbl. 42), con l'unica eccezione di un presunto soggetto osservato nel luglio 1983 in Valle d'Aosta (Bocca e Maffei 1997. Gli uccelli della Valle d'Aosta. Reg. Aut. Valle d'Aosta).

Avvistamento di Calandro maggiore *Anthus richardi* in Puglia.

A. Corso, L. Maumary e L. Vallotton

Il 14 febbraio 2000 sono visti e uditi 2-3 ind. a Frattarolo (FG).

* Mentre in Sicilia la specie è ormai sempre più frequente, in Puglia risulta ancora accidentale, probabilmente per la mancanza di osservatori.

Avvistamento invernale di Calandro *Anthus campestris* nel Lazio.

A. Corso e R. Gildi

Il 19 gennaio 1997 sono stati osservati almeno 4 ind. nei pressi del Lago di Fogliano (LT).

* Seppur non si conoscano altri casi in letteratura, pare esistano, per la zona, altre osservazioni invernali (F. Fraticelli com. pers.).

Avvistamenti di Ballerina nera *Motacilla alba yarrellii* in Italia.

(1) D. Occhiato

(2) A. Corso

(1) Alcuni ind. sono stati osservati in prossimità degli Stagni di Gaine, nella Piana Fiorentina (FI). Il 12 aprile 1996 è stata osservata una femmina probabilmente adulta. Il 30 marzo 1997 un maschio adulto e il 3 maggio dello stesso anno una femmina. Un ind. probabilmente femmina adulta è stata avvistata alla Diga del Bilancino (FI) dal 19 al 21 aprile 1998. Una femmina ha sostato nel porto di Viareggio (LU) dal 20 al 27 dicembre 1998. Una femmina è stata osservata il 11 gennaio 2000. Una femmina adulta è stata osservata il 5 marzo 2000 nella Bonifica della Costanza (Vecchiano, PI) nei pressi del lago di Massaciuccoli. In tutti i casi i soggetti erano imbrancati con gruppi di Ballerine bianche *Motacilla alba*.

(2) Due maschi sono stati osservati il 1° gennaio 1999 ed il 23 febbraio 2000 presso le Saline di Priolo (SR).

* Le osservazioni di Ballerina nera, negli ultimi anni, sono in incremento praticamente in tutta Italia.

Osservazione invernale di Cutrettola *Motacilla flava* in Emilia-Romagna.

N. Baccetti

Il 24 dicembre 2000 un ind. è stato osservato alle Saline di Cervia. Si trovava su di un argine erboso insieme ad un gruppo di Spioncelli *Anthus spinoletta*. Il soggetto è stato udito da altri rilevatori anche in date successive.

* Ancora un avvistamento invernale di questa specie spiccatamente estiva (Grattini e Sbravati in Arcamone e Brichetti 2000. Avocetta 24: 64).

Avvistamento di Usignolo maggiore *Luscinia luscinia* in Toscana.

D. Occhiato

Il 17 settembre 2000 è stato osservato un ind. nella Bonifica della Costanza (Vecchiano, PI) nei pressi del lago di Massaciuccoli.

* Nonostante la specie si sia fatta più regolare negli ultimi anni nell'Italia settentrionale, nel resto del paese è da ritenersi estremamente rara.

Avvistamento di Pettazzurro orientale *Luscinia svecica svecica* nel Lago di Massaciuccoli (Toscana).

A. Quaglierini

L'8 marzo 2000 sono stato osservati quattro maschi in canto nel padule del lago di Massaciuccoli (LU). Sostavano nel raggio di 100 metri e si esibivano dalla sommità di cespugli di salice nella zona delle ex-risaie di Massarosa.

* Interessante concentrazione di ind. della sottospecie meno frequente nel nostro paese.

Prima segnalazione italiana di Saltimpalo "caucasico" *Saxicola torquata variegata*.

A. Corso, W. Silvestrini e G. Terranova

Il 1° gennaio 1998 un maschio adulto è stato trovato morto, in avanzato stato di decomposizione, a Capo Murro di Porco (SR). L'ind. mostrava la distintiva caratteristica di 2/3 della coda bianchi.

* Si tratta della prima segnalazione di questa sottospecie per l'Italia.

Primo avvistamento invernale di Stiaicino *Saxicola rubetra* in Sicilia.

A. Corso, C. Cardelli e G. Chiofalo

Un ind. è stato osservato il 5 gennaio 2000 in loc. Muculufa (SR).

* Si tratta del primo avvistamento invernale in Sicilia e tra i pochi per l'Italia.

Avvistamento di Monachella dorsonero *Oenanthe pleschanka* sulla Laguna di Orbetello (Toscana).

A. Corso e M. Lausetti

Il 28 novembre 1998 un maschio del 1° inverno è stato osservato nei campi della Riserva Naturale WWF di Orbetello (GR).

* Si tratta della 11° segnalazione italiana. A queste segnalazioni va aggiunto un maschio adulto in abito ripr. osservato sullo Stretto di Messina nell'aprile 1992 (Corso, Cacace e Rocco ined.).

Segnalazione invernale di Tordo golanera *Turdus ruficollis atrogularis* nel Salento (Puglia).

G. Marzano

Il 30 gennaio 2000 in agro Aradeo (LE) è stato rinvenuto un maschio di questa specie. L'ind. si trovava in un'area particolarmente frequentata da Turdidi, caratterizzata dalla presenza di estesi oliveti frammisti a siepi di macchia mediterranea.

* Si tratta dell'unica segnalazione di questa specie per l'Italia meridionale.

Avvistamento di Pagliarolo *Acrocephalus paludicola* in Sicilia.

C. Iapichino

Il 15 ottobre 2000 un ind. è stato osservato allo Stagno di Vendicari (SR).

* La specie ha subito un forte declino in tutto il suo areale, facendosi più rara anche nel nostro paese. Si tratta della 5° segnalazione per la Sicilia.

Avvistamento di Silvia di Rüppell *Sylvia rueppelli* in Sicilia.

A. Corso e R. Ientile

Il 29 marzo 1997 è stato osservato un maschio a Capo Murro di Porco (SR).

* Si tratta del 9° avvistamento per la Sicilia.

Avvistamento di Bigia padovana *Sylvia nisoria* nel Messinese (Sicilia).

A. Corso, W.S. Clark e G. Chiofalo

Il 4 ottobre 2000 un juv è stato osservato sull'Isola di Salina (ME).

* Si tratta della 3° segnalazione per la Sicilia.

Avvistamento di un gruppo di Basettini *Panurus biarmicus* in Sicilia.

A. Corso, L. Maumary e L. Vallotton

Il 16 febbraio 2000 è stato osservato un gruppo di 3-5 ind. nelle Saline di Siracusa.

* La specie è molto rara in Sicilia. Dopo la sua estinzione locale, si conoscono soltanto 4 segnalazioni.

Avvistamento di Gracchio corallino *Pyrhacorax pyrrhacorax* all'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

P. Sposimo

Tra ottobre e dicembre 2000 un ind. è stato ripetutamente osservato all'Isola di Capraia (LI), mentre stazionava nell'area della ex-Colonia Penale, spesso in compagnia di Corvi imperiali *Corvus corax*.

* La specie è sedentaria e compie parziali erratismi invernali. Questo ind. molto probabilmente appartiene alla vicina popolazione delle Alpi Apuane. Si conoscono segnalazioni storiche della specie nell'Arcipelago Toscano, dove questa specie risulta accidentale (Arcamone ined.).

Osservazioni sul flusso migratorio primaverile del Corvo *Corvus frugilegus* in Sicilia.

C. Cardelli, A. Corso e R. Ientile

Singoli ind. sono stati osservati il 10 aprile 1998 e il 29 febbraio 1999 da Ganzirri-Torre Faro in volo sullo Stretto di Messina. Il 6 febbraio 2000 sono stati osservati dal Monte Dinnamare (ME) 3 ind. sempre sullo Stretto.

* Queste osservazioni, unitamente ad altre in anni precedenti (Corso in Arcamone e Bricchetti 1997. Avocetta 21: 226), sembrano attestare la possibilità che questi ind. in risalita primaverile sullo Stretto di Messina possano appartenere ad un piccolo nucleo svernante in Sicilia, in qualche area interna non conosciuta.

Presenza invernale di Storno roseo *Pastor roseus* in Emilia-Romagna.

A. Corso, L. Cattini e A. Schianchi

Un juv. è stato rinvenuto ferito a Fidenza (PR) il 28 novembre 1999 e recapitato al Centro Rapaci di

Parma. L'esemplare è attualmente conservato nel Museo INFS.

* La specie oltre ad essere irregolare in Italia è estremamente rara in autunno e inverno.

Avvistamento di un ibrido di Passera sarda *Passer hispaniolensis* x Passera mattugia *Passer montanus* in Sicilia.

A. Corso, R. Ientile, C. Iapichino, G. Consoli, W. Silvestrini e G. Terranova

Tra luglio e agosto 1998 un maschio adulto ibrido è stato osservato alle Saline di Siracusa, spesso in canto sui piloni della linea elettrica.

* Si tratta probabilmente del 2° ibrido conosciuto per l'Italia.

Avvistamento di Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus* in Sicilia.

A. Corso e C. Iapichino

Il 26 dicembre 1997 è stato osservata una femmina juv. e successivamente si è udito il verso in prossimità delle Saline di Siracusa.

* Si tratta della 1° segnalazione per la Sicilia di una specie i cui avvistamenti sono sempre più frequenti in Italia.

Osservazioni di Venturone *Serinus citrinella* sullo Stretto di Messina (Sicilia).

A. Corso e C. Cardelli

Due ind. sono stati osservati rispettivamente il 25 aprile 1998 ed il 26 febbraio 1999 in loc. Torre Faro-Ganzirri, sullo Stretto di Messina.

* Sono le prime due segnalazioni siciliane della specie. Sono praticamente sconosciute le abitudini dispersive di questa specie, in particolare della sottospecie insulare *Serinus c. corsicana*, a cui probabilmente appartenevano questi soggetti.

Avvistamento di Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos* in provincia di Belluno (Veneto).

M. Dal Pont

Nel novembre 1997 è stato ripetutamente osservato e fotografato un maschio nelle campagne di Belluno. L'ind. era imbrancato con alcuni Migliarini

di palude *Emberiza schoeniclus*.

* Si tratta della prima segnalazione in anni recenti nella provincia di Belluno (Zenatello et al. 1998. Atti Conv. Aspetti Naturalistici della Provincia di Belluno: 327-339). È specie migratrice regolare per l'Italia, con segnalazioni più frequenti nelle regioni nord-orientali, e recenti casi di svernamento in Toscana (D. Occhiato ined.).