

Nuovi avvistamenti

a cura di EMILIANO ARCAMONE e PIERANDREA BRICHETTI

Come avevamo anticipato nel Foglio di contatto n. 1, rivede finalmente la luce la rubrica "Nuovi avvistamenti", apparsa "a singhiozzo" su Avocetta e, comunque, arenatasi dopo l'ultima comparsa del numero di giugno 1992 (Avocetta 16: 53-54).

Questa nuova serie della rubrica assume anche un significato particolare sia come testimonianza di una volontà precisa del Centro di mantener fede agli impegni assunti, sia perchè frutto di un accordo con la Rivista Italiana di Ornitologia che, d'ora innanzi, consiglierà agli autori di far confluire in questa sede le segnalazioni di singoli avvistamenti che le dovessero pervenire.

Come di consueto facciamo appello alla collaborazione di tutti (soci e lettori), affinché gli avvistamenti interessanti di rilevanza nazionale non si perdano in mille rivoli, ma confluiscono in questa nostra rubrica, per il bene comune di tutti.

Il nuovo staff che curerà la rubrica "Nuovi avvistamenti" a cui si dovrà fare riferimento è composto da:

Emiliano Arcamone, via Adolfo Tommasi 20/C, 57124 Livorno:
coordinatore, responsabile per l'Italia centro-meridionale;

Pierandrea Brichetti, via Vittorio Veneto 30, 25024 Verolavecchia (BS):
responsabile per l'Italia settentrionale;

Bruno Massa, Ist. Entomologia Agraria, v.le delle Scienze 13, 90128 Palermo:
responsabile per la Sicilia e la Calabria;

Helmar Schenk, via Valleggio 1, 09134 Cagliari:
responsabile per la Sardegna.

Avvistamento invernale di Strolaga maggiore *Gavia immer* lungo il litorale laziale

*F. Bulgarini, G.P. Faleschini, N. Henson, G. Pinsone
& A. Sterlicchio.*

Il giorno 2 febbraio 1991 è stato osservato un individuo lungo la costa antistante la località Focene (Roma).

* Si tratta della seconda segnalazione per il Lazio (Truffi 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli 1). Interessante avvistamento in quanto avvenuto in ambiente marino, poco frequentato dalla specie in occasione delle sporadiche comparse.

Sosta autunnale di un gruppo di Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus* in Calabria

A. Bavusi & E. Guardascione

Il giorno 2 ottobre 1994 sono stati osservati 3 individui adulti presso il Lago di Pignola (Potenza). Questi esemplari hanno sostato nel bacino fino alla metà del mese.

* La specie è di comparsa occasionale in Calabria. La presenza in zone umide interne è comunque più rara.

Svernamento di gruppi di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* in Lombardia e Toscana

(1) *A. Negri*, (2) *E. Arcamone*

(1) Nel periodo compreso tra il 15 novembre 1993 e la fine di febbraio 1994 è stato osservato un gruppo di 8 individui tra Alagna Lomellina e Valleggio (Pavia). Nel gennaio 1995 ha sostato nuovamente nella stessa zona un gruppo di 11 individui.

(2) Nell'inverno 1994-1995 presso il Padule di Suese (Livorno) ha sostato un gruppo di 30 individui.

* Gli avvistamenti testimoniano un continuo incremento delle presenze invernali della specie nell'areale occupato a partire dagli anni '80 (Brichetti e Grussu 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli 1). In particolare in Toscana si notano le presenze più numerose dell'Italia continentale, in relazione ad un flusso di individui provenienti dalla Camargue (archivio I.N.F.S.).

Presenza invernale di Airone schistaceo *Egretta gularis* in Lombardia

D. Piccolino & G. Corelli

Nel periodo compreso tra il 21 gennaio ed il 10 febbraio 1995 è stato osservato e fotografato un individuo melanico nei pressi di Vigevano (Pavia).

* Si tratta del primo avvistamento invernale della specie nel nostro paese. Tutte le segnalazioni conosciute sono comprese nel periodo primaverile-estivo (Brichetti e Lo Valvo 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli 1; Brichetti et al. 1994, Riv. ital. Orn. 63: 193-198).

Segnalazione invernale di un gruppo di Fenicottero *Phoenicopterus ruber* nel Delta del Po

P. Girardi

Il 18 dicembre 1994 sono stati osservati 23 individui in sosta in Valle Cà Zuliani nel Delta del Po (Veneto).

* Si tratta presumibilmente della prima segnalazione invernale per questa zona umida che conferma l'incremento del numero di avvistamenti in questo periodo dell'anno, registrato recentemente nelle zone umide costiere dell'Emilia Romagna (Passarella et al. 1994, Riv. ital. Orn. 64: 174-175)

Inconsuete soste di Oca facciabianca *Branta leucopsis* in Toscana

(1) L. Becherucci, S. Benucci, R. Gambogi, C. Musetti, P. Politi & A. Voleri

(2) E. Arcamone & M. Vierucci

(1) Il giorno 14 ottobre 1994 lungo il tratto di costa compreso tra Viareggio (Lucca) e la foce del fiume Serchio (Pisa) sono state avvistate in volo 2 individui che hanno sostato successivamente nelle Lame di S. Rossore (Pisa). Un individuo di questi si è trattenuto nella zona umida fino alla prima decade di gennaio 1995.

(2) Dall'inizio di febbraio fino a metà maggio 1995 un gruppo di 5 individui ha sostato in alcuni laghetti artificiali all'interno di un'Azienda faunistica presso Cenaia (Pisa).

* La specie compare accidentalmente in Toscana (due catture inizi secolo). Particolarmente interessante ed inconsueta, anche per il tipo di ambiente frequentato e la distanza di questo dalla costa, la sosta del gruppo in primavera.

Prolungata sosta di Oca colombaccio *Branta bernicla* nella Laguna di Orbetello (Grosseto)

E. Arcamone

Nell'autunno 1992 un individuo è comparso nella Laguna di Orbetello sostando nella zona fino a febbraio 1993.

* La specie è estremamente rara per l'Italia centro meridionale. Si conoscono 9 segnalazioni per la Toscana (Arcamone e Baccetti ined.). Inconsueto il periodo di arrivo che trova riscontro soltanto in un avvistamento di un individuo avvenuto il 6 settembre 1981 agli Stagni di Bocca d'Ombrone (Nardi ined.).

Prima segnalazione italiana di Alzavola "americana" *Anas crecca carolinensis*

F. Panzarin

Il 14 dicembre 1990 un individuo maschio è stato abbattuto in prossimità del fiume Livenza a Torre di Mosto (Veneto).

* Prima segnalazione italiana di questa sottospecie che compare con una certa regolarità nel nord Europa, attraverso l'Atlantico (Madge e Bum 1988, Wildfowl).

Svernamento di Moretta grigia *Aythya marila* nel Salento (Puglia)

G. Marzano & S. Panzera

I primi di gennaio del 1995 tre individui sono stati osservati nel bacino di raffreddamento dello stabilimento Enichem di Brindisi, in un gruppo di circa 1000 anatre tuffatrici, che risultava presente in loco da circa un mese e che vi si è trattenuto fino ai primi di febbraio.

* Specie non abitualmente svernante in Puglia. Con precedenti in un individuo il 5/3/88 e due individui l'8-25/12/90 a 'Le Cesine'. Quest'anatra compare sporadicamente nell'Italia meridionale (Genero 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli 1).

Svernamento di Poiana calzata *Buteo lagopus* in Toscana

F. Acerbi, S. Benucci, P. Politi

Il 2 dicembre 1994 un individuo è stato osservato presso il Padule di Bolgheri (Livorno). Lo stesso ha sostato nella zona nel gennaio 1995.

* La specie è di comparsa occasionale in Italia centra-

le. Soltanto due segnalazioni in Toscana negli ultimi 50 anni (Micali 1992, in Brichetti et al., Fauna d'Italia, Uccelli 1).

Avvistamento di Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* nel Bresciano (Lombardia)

S. Mazzotti

Il 9 ottobre 1993 un individuo immaturo è stato osservato posato in prossimità del fiume Oglio, presso Villagana (Brescia).

* Per l'Italia la specie è di comparsa rara ed irregolare. Per la Lombardia la specie è stata segnalata 8 volte (Brichetti e Fasola 1990, Atlante degli Uccelli nidificanti in Lombardia, Appendice).

Nuova segnalazione di Aquila di Bonelli *Hieräetus fasciatus* in Piemonte

M. Della Toffola, F. Carpegna & G. Alessandria

Il 1 marzo 1992 un individuo immaturo è stato avvistato in volo in compagnia di un gruppo di Poiane *Buteo buteo* alla confluenza Po-Sesia (Alessandria).

* Per il Piemonte la specie è da considerarsi accidentale (Boano e Mingozzi, 1985, Riv. Piem. St. Nat. 6: 3-67). È interessante notare che i recenti avvistamenti effettuati in Liguria siano tutti relativi a soggetti immaturi (Baghino e Leugio 1990, Avocetta 14: 45-57; Baghino ined.). Si ipotizza un flusso di individui provenienti dalla popolazione francese.

Avvistamento di un Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* in Toscana

E. Arcamone & M. Trusendi

Nei giorni 20 e 23 settembre 1994 un individuo adulto è stato osservato e fotografato presso il Padule di Suese (Livorno). Confermata l'appartenenza alla forma nominale.

* Specie accidentale per l'Italia continentale. In Toscana nel passato era di comparsa irregolare. Presenza possibile in relazione all'attuale espansione demografica della popolazione sarda.

Prima segnalazione di Piro piro pettorale *Calidris melanotos* per la Sardegna

S. Nissardi & P.F. Murgia

Dal 15 al 17 settembre 1994 un individuo è stato osservato nella Laguna di Santa Gilla nei pressi della foce del Flumini Mannu (Cagliari).

* Specie di provenienza americana accidentale per l'Italia. Si tratta della sesta segnalazione (terza per l'Italia insulare). I più recenti avvistamenti sono avvenuti in Toscana (Brichetti et al. 1994, Riv. ital. Orn. 63: 193-198).

Avvistamento di Sterna di Rüppel *Sterna bengalensis* a Vendicari (Sicilia)

A. Corso

Il 15 maggio 1994 è stato osservato un individuo adulto in abito completo a Vendicari (Siracusa).

* Questa specie è stata recentemente considerata migratore regolare per l'Italia (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital. Birdwatching 1: 61-73). Per la Sicilia la sua comparsa rimane ancora rara e irregolare: 6 segnalazioni, di cui l'ultima nel 1985 (Brichetti et al. 1985, Riv. ital. Orn. 55: 186-187).

Avvistamento di Succiacapre isabellino *Caprimulgus aegyptius* al Lago di Burano (Toscana)

F. Cianchi & R. Marrocco

Il 23 marzo 1991 un individuo in riposo sul terreno è stato avvistato e fotografato lungo il bordo del Lago di Burano (Grosseto).

* Specie accidentale: si tratta dell'ottava segnalazione per l'Italia (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital. Birdwatching 1: 61-73).

Avvistamento di un gruppo di Pispoletta *Calandrella rufescens* all' Isola di Capraia (Arcipelago Toscano)

S. Capone, F. Pieri & D. Occhiato

Il 31 marzo ed il 1 aprile 1991 sono stati osservati e fotografati 9 individui sull'Isola di Capraia (Livorno). Questo gruppo stazionava su di un campo sportivo in compagnia di una Calandrella.

* Inconsueto avvistamento di questo alaudide poco conosciuto, considerato accidentale per il nostro paese (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital. Birdwatching 1: 20-26).

Rinvenimento di Tordo golanera *Turdus ruficollis atrogularis* nel Trentino

G. Tormen

Il giorno 29 settembre 1991 è stato rinvenuto morto un individuo, femmina del primo inverno, su di un pascolo a 1600 m slm presso il Passo del Brocon (Trento).

* Specie accidentale per l'Italia. Questa risulta la 19^a segnalazione (Brichetti e Massa 1993, Riv. ital. Birdwatching 1: 20-26).

Primo avvistamento italiano di Tordo "golarossa"
Turdus ruficollis ruficollis

G. Giovine & A. Zambelli

I giorni 30 novembre e 2 dicembre 1994 è stato osservato un individuo maschio della sottospecie "golarossa" nei pressi di Bergamo (Lombardia). Il soggetto, pur non in perfette condizioni fisiche, si alimentava di bacche nei giardini e nelle aree coltivate limitrofe. Date le condizioni (punta della mandibola e timoniere esterne destre mancanti), non si può escludere che si tratti di individuo proveniente da cattività.

* Prima segnalazione per l'Italia della sottospecie "tipo" di origine siberiana.

Primo avvistamento di Culbianco isabellino
Oenanthe isabellina in Toscana

F. Acerbi, L. Becherucci & S. Benucci

Il 25 settembre 1993 un individuo è stato osservato nei pressi di Piombino (Livorno).

* Questa specie compare regolarmente soltanto in

Sicilia. Per il resto del paese è di comparsa accidentale, interessando principalmente le regioni meridionali. Migratore primaverile si conoscono soltanto altri due avvistamenti in periodo autunnale (Corso 1994, Riv. ital. Birdwatching 2: 9-21).

Osservazione di Trombettiere *Rhodopechys githaginea* all'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano)

F. Casale

Nei giorni 24 e 25 di aprile del 1989 è stato osservato e fotografato, in prossimità del paese di Capraia, un individuo di Trombettiere.

* Una segnalazione recente di una specie che un tempo non era tra gli accidentali più inconsueti.

Avvistamento di Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* in provincia di Siracusa (Sicilia)

A. Corso

Il 12 dicembre 1993 è stato osservato un individuo adulto nell'invaso artificiale di Lentini.

* Specie rara ed irregolare al Sud e sulle isole. Questa risulta la 12^a segnalazione per la Sicilia e la prima negli ultimi dieci anni.