

## Conferma della riproduzione del cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* in Sicilia

SALVATORE GRENCI<sup>1</sup>, MAURIZIO SARÀ<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Via L. Sturzo, 67 - 92100 Agrigento

<sup>2</sup> Dipartimento di Biologia Animale - Via Archirafi, 18 - 90123 Palermo

**Abstract** – *Great Spotted Cuckoo breeding confirmation in Sicily.* During the 2005/2007 spring, evidence of eight new breeding events were recorded in Southern Sicily. These new data add to the first 2004 record. They are not evidence of accidental immigration but possibly signs of a future colonization of the island, that not only has a great number of suitable habitats for the species, but also hosts a large population of the Magpie (*Pica pica*).

Il cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* è una specie Mediterraneo-Afrotropicale, che vive in Europa meridionale, Africa settentrionale e Asia Minore (Cramp 1985). In Europa è migratrice regolare e svernante irregolare. Le attuali conoscenze sulla sua diffusione riguardano la penisola Iberica, ove è discretamente diffusa, la Francia meridionale, la Turchia e la Grecia.

In Italia la specie è migratrice regolare, nidificante e svernante irregolare (Brichetti e Massa 1999). L'areale di nidificazione è abbastanza ristretto, anche se in apparente espansione. Già nel 1965 Moltoni considerava la presenza del Cuculo dal ciuffo in Italia meno rara di prima. Oggi l'areale di riproduzione ricade soprattutto in Toscana (Di Carlo 1981, Tellini Florenzano *et al.* 1997) e Lazio (Di Carlo 1981, Boano *et al.* 1995). Inoltre, una riproduzione in un nido di Averla cenerina, risalente al 1964, è riportata per l'Emilia Romagna da Bagni *et al.* (2003). Prove di riproduzione sono state riportate anche in Puglia (Panzeria 1989), Liguria (Aa.Vv. 1989) e Sardegna (Mocci Demartis 1971, Meschini e Frugis 1993). Presenze estive sono state segnalate anche in Veneto (in Bon *et al.* 2000, Rallo 1973) e in Molise (N. Norante *com. pers.*).

Secondo la *Nuova lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia* (LIPU e WWF 1998) il cuculo dal ciuffo è da considerarsi 'critically endangered', cioè specie ad alto rischio d'estinzione nel nostro paese.

Nel 2004, in Sicilia si è documentata la prima prova di riproduzione (Sciabica 2004) nei pressi di Mazara del Val-

lo (TP). Nel 2005 si sono registrate le seguenti ulteriori osservazioni:

- 20 giugno, a Butera (CL), due giovani già abili al volo in compagnia di tre gazze (*Pica pica*) in un borgo di campagna alberato (M. Sarà *ined.*);
- 23 giugno, un nidiaceo di circa 15 giorni di età ritrovato in territorio di Licata (AG; L. Ribisi *ined.*);
- 4 luglio, tra Comiso e Modica (RG), un giovane che chiedeva l'imbeccata ad una gazza in un carrubeto (S. Greci *ined.*).

Nel 2006 singoli giovani sono stati osservati anche nel mese di giugno nella R.N.O. di Torre Salsa (Siciliana, AG) da M. Lo Valvo e da uno di noi (S.G.), in quest'ultimo caso in compagnia di una gazza. Sempre nel 2006, segnalate singole nidificazioni presso Caltanissetta e Siracusa (Falci e Testolino in Mellone e Sighele 2007), nonché vicino all'invaso Comunelli in prov. di Caltanissetta (Mascara 2007).

La riproduzione è stata confermata nei pressi di Ribera anche nell'estate 2008 (un giovane sulla SP Ribera-Cattolica Eraclea, SG con N. Di Lucia e F. Lo Scalzo, *oss. pers.*).

Nel 2007 invece ulteriori prove della riproduzione sono state raccolte nell'Agrigentino: a Ribera, in un oliveto; in territorio di Palma di Montechiaro (contrada Crociferi), in un mandorleto adiacente un macchione di *Quercus ilex*; e nel demanio forestale di Monte Cavallo a Cianciana, all'interno di un rimboscimento di *Pinus halepensis*. In tutti e tre i casi un giovane chiedeva insistentemente l'imbeccata ad una gazza.

Le segnalazioni di questi ultimi anni sono tutte riconducibili alla fascia meridionale dell'isola, e potrebbero indicare una recente immigrazione. La specie potrebbe aver estivato e/o nidificato già prima del 2004, sfuggendo alle osservazioni grazie alle sue abitudini piuttosto elusive.

Sarà interessante verificare se a queste nidificazioni seguirà un'effettiva colonizzazione della Sicilia meridionale, dove gli ambienti aridi aperti misti a boschi termofili, pro-

pri del cuculo del ciuffo, sono diffusi, insieme a cospicue popolazioni di Gazza (*Pica pica*), suo ospite preferito.

**Ringraziamenti** – Si ringraziano il prof. Bruno Massa per la rilettura critica del testo, Lillo Ribisi e la sezione WWF di Licata per la preziosa collaborazione.

## BIBLIOGRAFIA

- Aa.Vv. 1989. Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria. Cataloghi dei beni naturali Regione Liguria. Genova. N. 1: 66.
- Bagni L, Sighele M, Passarella M, Premuda G, Tinarelli R, Cocchi L, Leoni G 2003. Check list degli uccelli dell'Emilia Romagna dal 1990 al 2003. *Picus* 56: 85-107.
- Boano A, Brunelli M, Bulgarini F, Montemaggiori A, Sarrocco S, Visentin M (red.) 1995. Atlante degli Uccelli nidificanti nel Lazio. SROPU. *Alula* Vol. spec. (1-2): 62-63.
- Bon M, Cherubini G, Semenzato M, Stival E 2000. Atlante uccelli nidificanti in provincia di Venezia, Provincia di Venezia, Associazione Faunisti Veneti, Venezia.
- Brichetti P, Massa B 1999. Check list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. In Brichetti P., Gariboldi A. - Manuale pratico di Ornitologia Vol. 2, Edagricole Bologna, pp.168-190.
- Cramp S 1985. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. Volume IV. Oxford University Press, New York, pp 391-400.
- Di Carlo EA 1981. Ricerche ornitologiche sul litorale tirrenico del Lazio e Toscana. *Accad. Naz. Lincei Quaderni* 254: 77-236.
- LIPU, WWF (eds.) 1998. (Calvario E, Gustin M, Sarrocco S, Gallo Orsi U, Bulgarini F, Fraticelli F (in collaborazione con Gariboldi A, Brichetti P, Petretti F, Massa B)),: Nuova lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia. *Riv. Ital. Orn.* 69 (1): 3-43.
- Mascara R 2007. L'avifauna degli invasi artificiali di Cimìa, Comunelli e Disueri (Caltanissetta, Sicilia) aggiornamento 1993-2006. *Uccelli d'Italia* 32: 9-20.
- Mellone U, Sighele M 2007. Resoconto Ornitologico Italiano - anno 2007. *Avocetta* 31: 79-86.
- Meschini S, Frugis S 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 20: 1-344.
- Mocci Demartis A 1971. Il Cuculo dal ciuffo - *Clamator glandarius* (L.) - in Sardegna. *Riv. ital. Orn.* 41: 373-389.
- Moltoni E 1965. Il Cuculo dal ciuffo - *Clamator glandarius* (L.) - ha nidificato in Italia, ove si è fatto meno raro. *Riv. ital. Orn.* 35: 237-241.
- Panzerà S 1989. Deposizione di Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* in nido di Gazza *Pica pica* in provincia di Lecce. *Picus* 15: 114-115.
- Rallo G 1973. Nuova cattura di *Clamator glandarius* (L.) nel Veneto. *Riv. Ital. Orn.* 43: 159-160;
- Sciabica E 2004. Nidificazione di Fistione turco, *Netta rufina*, e riproduzione di Cuculo dal ciuffo, *Clamator glandarius*, in Sicilia (Italy). *Riv. Ital. Orn.* 74: 168-170.
- Tellini Florenzano G, Baccetti N, Arcamone E, Meschini E, Sposimo P (red.) 1997. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992). *Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno Mon.* N. 1.

