

La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima: liste A, B e C

GIANCARLO FRACASSO¹, NICOLA BACCETTI², LORENZO SERRA²

¹ Gruppo Nisorìa - c/o Museo naturalistico ed archeologico, Contrà Santa Corona 4, 36100 Vicenza
(giancarlo.fracasso@alice.it)

² ISPRA - Via Ca' Fornacetta 9, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
(nicola.baccetti@isprambiente.it; lorenzo.serra@isprambiente.it)

Riassunto – La Commissione Ornitologica Italiana, che opera nell'ambito del CISO, ha assunto il compito di redigere e mantenere aggiornata la lista degli uccelli italiani. A ciascuna specie appartenente all'avifauna nazionale sono stati attribuiti tre codici: il primo alfabetico (codice AERC da A ad E), riferito all'origine della presenza; gli altri due numerici, relativi rispettivamente allo status generale ed allo status riproduttivo, ed i cui valori (da 1 a 4) sono determinati dalla frequenza di ciascun evento entro determinati intervalli di tempo. Per quanto riguarda l'assetto sistematico, è stata seguita la nomenclatura adottata dall'AERC e dalla BOU nella redazione delle rispettive liste, tenendo conto delle raccomandazioni tassonomiche pubblicate da queste due organizzazioni ornitologiche. Sono state anche apportate alcune modifiche ai nomi italiani, dopo averle concordate con il gruppo di lavoro incaricato dal CISO per la revisione della nomenclatura italiana dell'avifauna mondiale. Questa lista verrà regolarmente aggiornata sul sito web del CISO.

Abstract – *The CISO-COI list of Italian birds – The A, B and C lists.* The Italian Ornithological Committee (COI) works within the Italian Centre for Ornithological Studies (CISO) with the specific assignment of compiling and updating the list of Italian birds. Three codes have been attributed to each species belonging to the list of Italian birds: an alphabetic code referred to the origin of the species in the territory (AERC code from A to E) and two codes referred respectively to the status of occurrence and breeding. Codes for the last two categories vary from 1 to 4 and are determined by the frequency of respective records within given time intervals. For the taxonomy, we adhered to the scientific nomenclature and systematic order applied by AERC and BOU for the compilation of the respective lists and following taxonomic recommendations. Some Italian common names have been changed in accordance with the CISO working group committed to review the Italian nomenclature of the birds of the world.

INTRODUZIONE

La Commissione Ornitologica Italiana (COI), che opera nell'ambito del Centro Italiano di Studi Ornitologici (CISO), ha introdotto nel 2001 tra i propri scopi fondamentali quello di produrre e mantenere periodicamente aggiornata la Lista CISO-COI degli Uccelli italiani.

Il gruppo di lavoro incaricato ha ritenuto innanzitutto necessario applicare alla lista il sistema di categorizzazione relativo all'origine della presenza di una specie nel territorio nazionale. Tale sistema è ormai da tempo in uso in quasi tutti i Paesi europei ed è in particolare raccomandato dall'Association of European Records and Rarities Committees (AERC). A questa classificazione primaria sono

state aggiunte per ciascuna specie due ulteriori categorie: status generale e status riproduttivo. I codici per queste ultime categorie sono determinati dalla frequenza degli episodi di presenza o nidificazione in Italia entro intervalli di tempo specificati a priori (ante 1950 e post 1949) e sono quelli individuati dalla Commissione per l'Avifauna Svizzera (CAvS) per la realizzazione della propria lista nazionale (Volet *et al.* 2000; Volet 2006).

METODI

La lista vede affiancati i codici relativi a tre differenti categorizzazioni, il cui significato è di seguito descritto.

I. Categorie AERC (lettera/e)

A specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950;

Ricevuto 23 gennaio 2008, accettato dopo revisione
24 febbraio 2009

- B specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 ed il 1949;
- C specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi; la cat. C vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime caratteristiche, insediate al di fuori dell'Italia;
- D specie di origine selvatica possibile ma non certa; la sua presenza può essere dovuta a fuga o immissione deliberata dalla cattività, a trasporto passivo ecc.; oppure specie che, per qualche motivo, non può essere inserita in una delle altre categorie. A differenza di quanto strettamente proposto dall'AERC e tenendo conto della situazione italiana, soprattutto in una prospettiva storica, questa categoria è stata ampliata per poter includere eccezionalmente (in particolare per esemplari già entrati nella letteratura storica) alcuni casi per i quali sussiste il dubbio di una segnalazione falsa (erronea o addirittura fraudolenta). Non sono stati qui contemplati i casi dubbi tra le categorie C ed E, che sono sempre assegnati a quest'ultima;
- E specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva dei requisiti previsti per la cat. C.

In un numero molto limitato di casi è risultato ammissibile e necessario l'utilizzo contemporaneo di due lettere: tipicamente, AC per specie diffuse con popolazioni naturali e non, in stagioni o zone diverse (Pernice rossa, Oca selvatica, ecc.) e BD per specie di cui sono state registrate presenze ritenute naturali prima del 1950 e solo di dubbia origine successivamente. La categoria E non è stata di regola impiegata per abbinamenti con le categorie "naturali", in quanto potenzialmente applicabile ad un numero troppo alto di casi. Tale abbinamento viene proposto solo quando ci si riferisce a specie accidentali o irregolari, per identificare situazioni in cui la fuga dalla cattività è ritenuta all'origine della maggioranza delle segnalazioni post 1950 e dunque tale da influenzare significativamente lo status generale delle specie.

La lista degli Uccelli italiani comprende esclusivamente le specie inserite nelle categorie A, B e C, che attualmente ammontano complessivamente a 526. I taxa attribuiti alle categorie D ed E non fanno parte a pieno titolo dell'avifauna nazionale e non contribuiscono numericamente alla sua composizione. Tuttavia gli elenchi delle specie assegnate a queste due ultime categorie (lista D e lista E) vengono ugualmente mantenuti ed aggiornati dalla COI stessa e verranno pubblicati successivamente.

II. Categorie di status generale (prima cifra):

- 1 regolare: presenza constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni;

- 2 irregolare: presenza constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni dopo il 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni;
- 3 accidentale: presenza constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950;
- 4 storico: presenza constatata almeno una volta, ma non dopo il 1950.

III. Categorie di status riproduttivo (seconda cifra):

- 1 regolare: nidificazione accertata in almeno 9 degli ultimi 10 anni;
- 2 irregolare: nidificazione accertata in 4-8 degli ultimi 10 anni;
- 3 accidentale: nidificazione accertata solo in 1-3 degli ultimi 10 o più anni;
- 4 storico: nidificazione apparentemente regolare in un qualsiasi periodo, ma mai negli ultimi 10 anni;
- 0 specie per la quale mancano prove certe di nidificazione.

Devono essere sottoposte alla COI le segnalazioni relative all'osservazione di qualsiasi specie eventualmente non presente nella liste A, B o C, nonché quelle che si riferiscono a specie codificate come 3 o 4 nella seconda colonna (status generale). Richiedono omologazione anche le prime nidificazioni italiane dopo il 1949, riferibili a specie prive di codice, o codificate come 4, nella terza colonna (status riproduttivo).

TASSONOMIA

In occasione della prima stesura di questa lista, resa disponibile solo on-line (www.ciso-coi.org) negli anni 2003-2008, per la sequenza di Ordini-Famiglie-Specie e per le attribuzioni tassonomiche a livello di Genere e di Specie, si era fatto riferimento alla checklist mondiale di Clements (2000), in quel momento l'opera più recente sull'argomento e regolarmente aggiornata attraverso uno specifico sito internet. Tuttavia, nei medesimi anni, si è assistito ad un vistoso incremento nella pubblicazione di lavori riguardanti la filogenesi e la sistematica di gruppi più o meno ampi di uccelli. Per valutare l'opportunità di utilizzare queste nuove conoscenze, in particolare nella redazione e nell'aggiornamento delle proprie liste, sono stati costituiti o potenziati appositi gruppi di specialisti in seno alle principali organizzazioni ornitologiche nazionali (BOU Records Committee's Taxonomic Subcommittee in Gran Bretagna, Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna nei Paesi Bassi, Commission de l'Avifaune Française in Francia, AOU Committee on Classification and Nomenclature negli Stati Uniti, ecc.) o sovranazionali, come nel caso del

Taxonomic Advisory Committee (TAC) nell'ambito dell'AERC. Proprio quest'ultima organizzazione si è particolarmente prodigata nel non facile tentativo di ottenere la massima uniformità nella redazione delle diverse liste nazionali. Parallelamente a questo rinnovato interesse per gli studi sistematici, sono state recentemente pubblicate, o riedite, numerose liste relative a territori geograficamente limitati, come nel caso di molte nazioni europee, ovvero ampie porzioni continentali (ad es. le Americhe o vasti settori dell'Asia), ed anche al mondo intero.

Tra le organizzazioni direttamente coinvolte nella stesura/gestione di queste liste, si sono venute a delineare, se non proprio diverse scuole di pensiero, almeno due principali linee di azione radicalmente differenti. Da una lato un approccio più "moderno", disponibile a recepire le informazioni provenienti dal crescente flusso di pubblicazioni inerenti anche la revisione di categorie sistematiche sovraspecifiche (sulla scia dei pionieristici lavori di biologia molecolare di Charles Sibley) e sollecito nel tradurre nella pratica tassonomica i risultati di queste indagini, dall'altro uno più "conservatore", propenso a mantenere stabile per quanto possibile la classificazione adottata, subordinando l'accettazione di eventuali modifiche a tale assetto consolidato alla presentazione di ulteriori conferme, e nello stesso tempo maggiormente interessato alle categorie sistematiche inferiori, il Genere e la Specie. Risulta evidente che quest'ultimo approccio non risponde ai principi del metodo scientifico che prevede la reversibilità delle scelte e non l'attesa indefinita di nuovi riscontri. Siamo quindi di fronte a due concezioni sostanzialmente differenti di classificazione, la prima come rappresentazione delle conoscenze sulla storia evolutiva dei taxa, la seconda soprattutto come strumento per la condivisione, la trasmissione e l'utilizzo di conoscenze sulle specie, piuttosto che un sistema che espliciti le relazioni di affinità tra le diverse componenti.

Tra i modernisti si colloca l'AOU, l'organismo che aggiorna la lista degli uccelli del Nord e Centro America attraverso regolari supplementi pubblicati sulla rivista *Auk*. Analogo è l'orientamento assunto dalla lista mondiale più recentemente pubblicata, la terza edizione della cosiddetta "Howard and Moore" (Dickinson 2003), adottata, oltre che dalla lista dei nomi inglesi degli uccelli del mondo (Gill e Wright 2006), patrocinata dall'International Ornithological Congress, anche da molte delle ultime pubblicazioni relative ad avifaune extra-europee.

Comprensibilmente questo approccio metodologico ha coinvolto anche la checklist mondiale edita da James Clements a partire dal 1972 e ora presa in carico dal Cornell Laboratory of Ornithology (Ithaca, New York), che ne ge-

stisce il continuo aggiornamento mediante uno specifico sito internet (www.birds.cornell.edu/clementschecklist). Infatti, mentre la 6ª ed ultima edizione stampata (2007) non si discosta sostanzialmente dall'impostazione, pure abbastanza innovativa, della precedente (quella da noi utilizzata per la prima stesura della lista italiana), le più recenti versioni disponibili on-line hanno adottato posizioni tassonomiche decisamente più avanzate, soprattutto per quanto concerne le macrocategorie sistematiche ed in particolare la sequenza delle famiglie entro i Passeriformes, uniformandosi esplicitamente per la gran parte alle scelte operate dal comitato per la nomenclatura dell'AOU. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, invece, solo in Germania è stata effettuata una scelta di questo tipo, ispirata soprattutto dalle autonome ricerche filogenetiche di Andreas Helbig, concretizzatesi anche nella redazione della lista nazionale (Barthel e Helbig 2006) patrocinata dalla DO-G ed adottata nella più recente sintesi sull'avifauna dell'Europa centrale (Bauer *et al.* 2005).

Sul fronte opposto gli altri Paesi europei si sono adeguati agli orientamenti espressi dalla BOU e dall'AERC, assumendo quindi una posizione contrastante: "conservatrice" a livello macrotassonomico, utilizzando per gli ordini e le famiglie (a parte minime eccezioni) la classificazione di Voous (1977), e quella "moderna" a livello di generi e specie.

Attualmente però, solo la commissione tassonomica della BOU prende in esame i continui contributi della ricerca, pubblicando su *Ibis* regolari "raccomandazioni tassonomiche" che, per quanto finalizzate esplicitamente alla lista nazionale, hanno una ricaduta di interesse generale (Knox *et al.* 2002, 2008; Sangster *et al.* 2004, 2005, 2007).

Di fronte a questa situazione e stante il nostro ruolo di semplici compilatori, ci è sembrata difficilmente sostenibile la scelta iniziale di seguire coerentemente e completamente la "lista Clements", scostandoci così radicalmente dalla linea tuttora seguita dalla maggioranza dei Paesi europei. Pur ritenendo opportuno che la lista nazionale risulti in ogni sua parte egualmente aggiornata rispetto all'evolvere delle conoscenze ornitologiche, questa pratica esigenza di conformità ha prevalso sulle nostre valutazioni di merito.

La presente lista ha perciò seguito sostanzialmente la nomenclatura e la sequenza sistematica adottate dall'AERC (AERC TAC 2003a), tenendo comunque conto delle raccomandazioni tassonomiche pubblicate dalla BOU ed applicate alla lista inglese (Dudley *et al.* 2006), regolarmente aggiornata online (www.bou.org.uk/recbrlst.html).

NOMI ITALIANI

Si è ritenuto appropriato affrontare in questa occasione anche alcune problematiche relative alla nomenclatura italiana, sia per un'esigenza di completezza (specie prive di nome italiano consolidato), sia perché alcuni dei nomi in uso richiedevano modifiche. Tuttavia ci siamo resi conto che l'applicazione rigida di regole, almeno dove la coerenza formale l'avrebbe resa obbligatoria, doveva necessariamente fare i conti con il principio dell'*uso consolidato*. Inoltre, per risolvere il problema nel modo più corretto e, per quanto possibile, definitivo, la Commissione ha concordato tali modifiche con il gruppo di lavoro (C. Violani e F. Barbagli) incaricato dal CISO della revisione della nomenclatura italiana dell'avifauna mondiale, in parte recentemente pubblicata (Violani e Barbagli 2006). I cambiamenti apportati hanno tenuto conto soprattutto di:

- coerenza formale nell'uso degli "attributi", in particolare quando riferiti a nomi di persona o di luogo;
- opportunità di utilizzare un "attributo specifico" nei casi in cui esistano più taxa ben diffusi in Italia ed aventi lo stesso "nome generico", uno dei quali privo di "attributo specifico" (fatta eccezione per quei nomi d'uso largamente consolidato anche nel vocabolario italiano non tecnico: es. Merlo, Civetta);
- scelta di "attributi specifici" ricavati dall'uso corrente (formalizzato e non: es. Piovanello comune, Forapaglie comune);
- opportunità di aggiungere l'attributo specifico nel caso di recente divisione di una specie in due diverse;
- nel caso di nomi derivati da lingue diverse dall'italiano, nei quali fossero presenti originariamente vocali con dieresi, queste sono state sostituite dall'usuale trascrizione fonetica per facilitarne la digitazione su tastiera (ü = ue, ecc.);
- rispetto alla prima stesura della lista on-line, per non

creare equivoci soprattutto negli utenti di madrelingua non italiana, si è preferito mantenere la notazione degli accenti, sia quelli tonici, sia quelli che indicano il grado di apertura di alcune vocali (elenco preparato da A. Micheli). Queste specificazioni sono fornite solo nella versione su foglio elettronico ed esclusivamente come "commento" a ciascuna cella riportante un nome italiano.

DURATA DELLA LISTA

Una lista, come quella qui presentata, costituisce la sintesi di una massa notevole di informazioni riferibili ad un particolare gruppo di organismi e ad un preciso ambito geografico. Per sua stessa natura, questa elencazione non può essere statica nel tempo, dovendo rispecchiare i continui cambiamenti a carico degli organismi trattati, cambiamenti sia di tipo biologico (variazioni di areale, di consistenza, ecc.), sia di tipo conoscitivo (nuove segnalazioni di presenza o riproduzione, incremento delle osservazioni, progressi nel chiarimento delle relazioni filetiche, ecc.) che possono avere notevoli ripercussioni tanto nei dettagli di singoli casi, quanto nella composizione e nell'ordinamento della lista stessa.

Riteniamo, pertanto, che essa debba essere per quanto possibile aggiornata di fronte agli eventuali cambiamenti che potranno coinvolgere, quasi in ogni momento, una qualsiasi delle diverse voci che la compongono, anche a costo di una relativa mancanza di stabilità.

Per questo motivo, avvalendoci delle possibilità offerte da Internet e traendo spunto da quanto già adottato da molte delle organizzazioni ornitologiche sopra menzionate, è nostra intenzione mantenere sul sito web del CISO versioni regolarmente aggiornate, da pubblicare ad intervalli maggiori sulla rivista Avocetta.

LISTA CISO-COI DEGLI UCCELLI ITALIANI (Parte prima)

LISTA A B C

Anseriformes

Anatidae

1	01520	<i>Cygnus olor</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Cigno reale	ACE11	
2	20800	<i>Cygnus atratus</i>	(Latham, 1790)	Cigno nero	CE11	(1)
3	01530	<i>Cygnus columbianus</i>	(Ord, 1815)	Cigno minore	A20	
4	01540	<i>Cygnus cygnus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cigno selvatico	A20	
5	01570	<i>Anser fabalis</i>	(Latham, 1787)	Oca granaiola	A10	(2)
6	01580	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Baillon, 1833	Oca zamperosee	AE30	
7	01590	<i>Anser albifrons</i>	(Scopoli, 1769)	Oca lombardella	A10	
8	01600	<i>Anser erythropus</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca lombardella minore	A30	
9	01610	<i>Anser anser</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca selvatica	AC11	
10	01630	<i>Anser caerulescens</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca delle nevi	ADE30	(3)
11	01660	<i>Branta canadensis</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca del Canada	CE20	
12	01670	<i>Branta leucopsis</i>	(Bechstein, 1803)	Oca facciabianca	AE20	
13	01680	<i>Branta bernicla</i>	(Linnaeus, 1758)	Oca colombaccio	A20	
14	01690	<i>Branta ruficollis</i>	(Pallas, 1769)	Oca collarosso	AE20	
15	01710	<i>Tadorna ferruginea</i>	(Pallas, 1764)	Casarca	ADE23	(4)
16	01730	<i>Tadorna tadorna</i>	(Linnaeus, 1758)	Volpoca	AC11	
17	01780	<i>Aix galericulata</i>	(Linnaeus, 1758)	Anatra mandarina	CE20	
18	01790	<i>Anas penelope</i>	Linnaeus, 1758	Fischione	A13	
19	01820	<i>Anas strepera</i>	Linnaeus, 1758	Canapiglia	A11	
20	01830	<i>Anas formosa</i>	Georgi, 1775	Alzavola asiatica	A30	
21	01840	<i>Anas crecca</i>	Linnaeus, 1758	Alzavola	A11	
22	01842	<i>Anas carolinensis</i>	J. F. Gmelin, 1789	Alzavola americana	A30	
23	01860	<i>Anas platyrhynchos</i>	Linnaeus, 1758	Germano reale	AC11	
24	01890	<i>Anas acuta</i>	Linnaeus, 1758	Codone	A13	
25	01910	<i>Anas querquedula</i>	Linnaeus, 1758	Marzaiola	A11	
26	01920	<i>Anas discors</i>	Linnaeus, 1766	Marzaiola americana	AE30	
27	01940	<i>Anas clypeata</i>	Linnaeus, 1758	Mestolone	A11	
28	01950	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(Ménétries, 1832)	Anatra marmorizzata	AE33	
29	01960	<i>Netta rufina</i>	(Pallas, 1773)	Fistione turco	A11	
30	01980	<i>Aythya ferina</i>	(Linnaeus, 1758)	Moriglione	A11	
31	02000	<i>Aythya collaris</i>	(Donovan, 1809)	Moretta dal collare	A30	
32	02020	<i>Aythya nyroca</i>	(Güldenstädt, 1770)	Moretta tabaccata	A11	
33	02030	<i>Aythya fuligula</i>	(Linnaeus, 1758)	Moretta	A11	
34	02040	<i>Aythya marila</i>	(Linnaeus, 1761)	Moretta grigia	A10	
35	02060	<i>Somateria mollissima</i>	(Linnaeus, 1758)	Edredone	A13	
36	02070	<i>Somateria spectabilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Re degli edredoni	A30	
37	02110	<i>Histrionicus histrionicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Moretta arlecchino	BDE40	(5)
38	02120	<i>Clangula hyemalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Moretta codona	A10	
39	02130	<i>Melanitta nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Orchetto marino	A10	
40	02150	<i>Melanitta fusca</i>	(Linnaeus, 1758)	Orco marino	A10	
41	02180	<i>Bucephala clangula</i>	(Linnaeus, 1758)	Quattrocchi	A10	
42	02200	<i>Mergellus albellus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pesciaiola	A10	
43	02210	<i>Mergus serrator</i>	Linnaeus, 1758	Smergo minore	A10	
44	02230	<i>Mergus merganser</i>	Linnaeus, 1758	Smergo maggiore	A12	
45	02250	<i>Oxyura jamaicensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Gobbo della Giamaica	C20	(6)
46	02260	<i>Oxyura leucocephala</i>	(Scopoli, 1769)	Gobbo rugginoso	A34	

continua

Galliformes

Tetraonidae

47	03260	<i>Bonasa bonasia</i>	(Linnaeus, 1758)	Francolino di monte	A11
48	03300	<i>Lagopus muta</i>	(Montin, 1776)	Pernice bianca	A11
49	03320	<i>Tetrao tetrix</i>	Linnaeus, 1758	Fagiano di monte	A11
50	03350	<i>Tetrao urogallus</i>	Linnaeus, 1758	Gallo cedrone	A11

Phasianidae

51	03450	<i>Colinus virginianus</i>	(Linnaeus, 1758)	Colino della Virginia	CE11
52	03550	<i>Alectoris chukar</i>	(J. E. Gray, 1830)	Coturnice orientale	CE11
53	03570	<i>Alectoris graeca</i>	(Meisner, 1804)	Coturnice	A11
54	03580	<i>Alectoris rufa</i>	(Linnaeus, 1758)	Pernice rossa	AC11
55	03590	<i>Alectoris barbara</i>	(Bonnaterre, 1790)	Pernice sarda	CE11
56	28010	<i>Francolinus erckelii</i>	(Rüppell, 1835)	Francolino di Erckel	CE11
57	03640	<i>Francolinus francolinus</i>	(Linnaeus, 1766)	Francolino	CE11 (7)
58	03670	<i>Perdix perdix</i>	(Linnaeus, 1758)	Starna	AC11
59	03700	<i>Coturnix coturnix</i>	(Linnaeus, 1758)	Quaglia	A11
60	03940	<i>Phasianus colchicus</i>	Linnaeus, 1758	Fagiano comune	CE11

Gaviiformes

Gaviidae

61	00020	<i>Gavia stellata</i>	(Pontoppidan, 1763)	Strolaga minore	A10
62	00030	<i>Gavia arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	Strolaga mezzana	A10
63	00040	<i>Gavia immer</i>	(Brünnich, 1764)	Strolaga maggiore	A20
64	00050	<i>Gavia adamsii</i>	(G. R. Gray, 1859)	Strolaga beccogiallo	A30

Procellariiformes

Diomedidae

65	00140	<i>Thalassarche melanophris</i>	(Temminck, 1828)	Albatro sopracciglio nero	A30
66	00200	<i>Diomedea exulans</i>	Linnaeus, 1758	Albatro urlatore	A30

Procellariidae

67	00210	<i>Macronectes giganteus</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Ossifraga	A30
68	00220	<i>Fulmarus glacialis</i>	(Linnaeus, 1761)	Fulmaro	A30
69	00230	<i>Daption capense</i>	(Linnaeus, 1758)	Procellaria del Capo	A30
70	00340	<i>Bulweria bulwerii</i>	(Jardine & Selby, 1828)	Berta di Bulwer	A30
71	00360	<i>Calonectris diomedea</i>	(Scopoli, 1769)	Berta maggiore	A11
72	00400	<i>Puffinus gravis</i>	(O'Reilly, 1818)	Berta dell'Atlantico	B40
73	00430	<i>Puffinus griseus</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Berta grigia	A30
74	00462	<i>Puffinus yelkouan</i>	(Acerbi, 1827)	Berta minore	A11
75	00463	<i>Puffinus mauretanicus</i>	P. R. Lowe, 1921	Berta balearica	A20
76	00480	<i>Puffinus baroli</i>	(Bonaparte 1857)	Berta minore fosca	A30 (8)

Hydrobatidae

77	00500	<i>Oceanites oceanicus</i>	(Kuhl, 1820)	Uccello delle tempeste di Wilson	A30
78	00520	<i>Hydrobates pelagicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Uccello delle tempeste	A11
79	00550	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	(Vieillot, 1817)	Uccello delle tempeste codaforcuta	A30
80	00560	<i>Oceanodroma monorhis</i>	(Swinhoe, 1867)	Uccello delle tempeste di Swinhoe	A30

Pelecaniformes

Sulidae

81	00700	<i>Sula leucogaster</i>	(Boddaert, 1783)	Sula fosca	A30
----	-------	-------------------------	------------------	------------	-----

continua

La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima

82	00710	<i>Morus bassanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Sula	A10
Pelecanidae					
83	00880	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Linnaeus, 1758	Pellicano comune	A20
84	00900	<i>Pelecanus rufescens</i>	J. F. Gmelin, 1789	Pellicano rossiccio	A20 (9)
85	00890	<i>Pelecanus crispus</i>	Bruch, 1832	Pellicano riccio	A30
Phalacrocoracidae					
86	00720	<i>Phalacrocorax carbo</i>	(Linnaeus, 1758)	Cormorano	A11
87	00800	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	(Linnaeus, 1761)	Marangone dal ciuffo	A11
88	00820	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	(Pallas, 1773)	Marangone minore	A12
Ciconiiformes					
Ardeidae					
89	00950	<i>Botaurus stellaris</i>	(Linnaeus, 1758)	Tarabuso	A11
90	00980	<i>Ixobrychus minutus</i>	(Linnaeus, 1766)	Tarabusino	A11
91	01000	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	(Swinhoe, 1873)	Tarabusino orientale	B40
92	01040	<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	Nitticora	A11
93	01080	<i>Ardeola ralloides</i>	(Scopoli, 1769)	Sgarza ciuffetto	A11
94	01110	<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	Airone guardabuoi	A11
95	01182	<i>Egretta gularis</i>	(Bosc, 1792)	Airone schistaceo	A20 (10)
96	01190	<i>Egretta garzetta</i>	(Linnaeus, 1766)	Garzetta	A11
97	01200	<i>Casmerodius intermedius</i>	(Wagler, 1829)	Airone bianco intermedio	A30 (11)
98	01210	<i>Casmerodius albus</i>	(Linnaeus, 1758)	Airone bianco maggiore	A11 (12)
99	01220	<i>Ardea cinerea</i>	Linnaeus, 1758	Airone cenerino	A11
100	01240	<i>Ardea purpurea</i>	Linnaeus, 1766	Airone rosso	A11
Ciconiidae					
101	01310	<i>Ciconia nigra</i>	(Linnaeus, 1758)	Cicogna nera	A11
102	01340	<i>Ciconia ciconia</i>	(Linnaeus, 1758)	Cicogna bianca	AC11
Threskiornithidae					
103	01360	<i>Plegadis falcinellus</i>	(Linnaeus, 1766)	Mignattaio	A11
104	01420	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	(Latham, 1790)	Ibis sacro	C11
105	01440	<i>Platalea leucorodia</i>	Linnaeus, 1758	Spatola	A11
Phoenicopteriformes					
Phoenicopteridae					
106	01472	<i>Phoenicopus roseus</i>	Pallas, 1811	Fenicottero	A11
Podicipediformes					
Podicipedidae					
107	00070	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	(Pallas, 1764)	Tuffetto	A11
108	00090	<i>Podiceps cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Svasso maggiore	A11
109	00100	<i>Podiceps grisegena</i>	(Boddaert, 1783)	Svasso collaroso	A10
110	00110	<i>Podiceps auritus</i>	(Linnaeus, 1758)	Svasso cornuto	A10
111	00120	<i>Podiceps nigricollis</i>	C. L. Brehm, 1831	Svasso piccolo	A12
Falconiformes					
Accipitridae					
112	02310	<i>Pernis apivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falco pecchiaiolo	A11
113	02350	<i>Elanus caeruleus</i>	(Desfontaines, 1789)	Nibbio bianco	A30

continua

114	02380	<i>Milvus migrans</i>	(Boddaert, 1783)	Nibbio bruno	A11
115	02390	<i>Milvus milvus</i>	(Linnaeus, 1758)	Nibbio reale	A11
116	02430	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Aquila di mare	A24
117	02460	<i>Gypaetus barbatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gipeto	AC11
118	02470	<i>Neophron percnopterus</i>	(Linnaeus, 1758)	Capovaccaio	A11
119	02510	<i>Gyps fulvus</i>	(Hablizl, 1783)	Grifone	AC11
120	02550	<i>Aegyptius monachus</i>	(Linnaeus, 1766)	Avvoltoio monaco	AC24 (13)
121	02560	<i>Circus gallicus</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	Biancone	A11
122	02600	<i>Circus aeruginosus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falco di palude	A11
123	02610	<i>Circus cyaneus</i>	(Linnaeus, 1766)	Albanella reale	A13
124	02620	<i>Circus macrourus</i>	(S. G. Gmelin, 1770)	Albanella pallida	A10
125	02630	<i>Circus pygargus</i>	(Linnaeus, 1758)	Albanella minore	A11
126	02670	<i>Accipiter gentilis</i>	(Linnaeus, 1758)	Astore	A11
127	02690	<i>Accipiter nisus</i>	(Linnaeus, 1758)	Sparviere	A11
128	02730	<i>Accipiter brevipes</i>	(Severtzov, 1850)	Sparviere levantino	A30
129	02870	<i>Buteo buteo</i>	(Linnaeus, 1758)	Poiana	A11
130	02880	<i>Buteo rufinus</i>	(Cretzschmar, 1827)	Poiana codabianca	A10
131	02900	<i>Buteo lagopus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Poiana calzata	A20
132	02930	<i>Aquila clanga</i>	Pallas, 1811	Aquila anatraia maggiore	A10 (14)
133	02920	<i>Aquila pomarina</i>	C. L. Brehm, 1831	Aquila anatraia minore	A10
134	02980	<i>Aquila pennata</i>	(J. F. Gmelin, 1788)	Aquila minore	A10
135	02960	<i>Aquila chrysaetos</i>	(Linnaeus, 1758)	Aquila reale	A11
136	02990	<i>Aquila fasciata</i>	Vieillot, 1822	Aquila di Bonelli	A11
137	02941	<i>Aquila rapax</i>	(Temminck, 1828)	Aquila rapace	B40
138	02942	<i>Aquila nipalensis</i>	Hodgson, 1833	Aquila delle steppe	A30
139	02950	<i>Aquila heliaca</i>	Savigny, 1809	Aquila imperiale	A20 (15)

Pandionidae

140	03010	<i>Pandion haliaetus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falco pescatore	A14
-----	-------	--------------------------	------------------	-----------------	-----

Falconidae

141	03030	<i>Falco naumanni</i>	Fleischer, 1818	Grillaio	A11
142	03040	<i>Falco tinnunculus</i>	Linnaeus, 1758	Gheppio	A11
143	03070	<i>Falco vesperinus</i>	Linnaeus, 1766	Falco cuculo	A11
144	03080	<i>Falco amurensis</i>	Radde, 1863	Falco dell' Amur	A30
145	03090	<i>Falco columbarius</i>	Linnaeus, 1758	Smeriglio	A10
146	03100	<i>Falco subbuteo</i>	Linnaeus, 1758	Lodolaio	A11
147	03110	<i>Falco eleonorae</i>	Gené, 1839	Falco della Regina	A11
148	03120	<i>Falco concolor</i>	Temminck, 1825	Falco unicolore	A30 (16)
149	03140	<i>Falco biarmicus</i>	Temminck, 1825	Lanario	A11
150	03160	<i>Falco cherrug</i>	J. E. Gray, 1834	Sacro	A10
151	03200	<i>Falco peregrinus</i>	Tunstall, 1771	Falco pellegrino	A11
152	03210	<i>Falco pelegrinoides</i>	Temminck, 1829	Falcone della Barberia	B40

Gruiformes

Turnicidae

153	04000	<i>Turnix sylvaticus</i>	(Desfontaines, 1789)	Quaglia tridattila	B44
-----	-------	--------------------------	----------------------	--------------------	-----

Rallidae

154	04070	<i>Rallus aquaticus</i>	Linnaeus, 1758	Porciglione	A11
155	04080	<i>Porzana porzana</i>	(Linnaeus, 1766)	Voltolino	A12
156	04100	<i>Porzana parva</i>	(Scopoli, 1769)	Schiribilla	A12

continua

La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima

157	04110	<i>Porzana pusilla</i>	(Pallas, 1776)	Schiribilla grigiata	A23
158	04170	<i>Porzana marginalis</i>	Hartlaub, 1857	Voltolino striato	A30
159	04210	<i>Crex crex</i>	(Linnaeus, 1758)	Re di quaglie	A11
160	04240	<i>Gallinula chloropus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gallinella d'acqua	A11
161	04250	<i>Porphyrio alleni</i>	Thomson, 1842	Pollo sultano di Allen	A30
162	04260	<i>Porphyrio martinica</i>	(Linnaeus, 1766)	Pollo sultano della Martinica	B40
163	04270	<i>Porphyrio porphyrio</i>	(Linnaeus, 1758)	Pollo sultano	ACE11
164	04290	<i>Fulica atra</i>	Linnaeus, 1758	Folaga	A11
165	04310	<i>Fulica cristata</i>	J. F. Gmelin, 1789	Folaga crestata	B40
Gruidae					
166	04410	<i>Grus virgo</i>	(Linnaeus, 1758)	Damigella della Numidia	A34
167	04330	<i>Grus grus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gru	A14
Otididae					
168	04420	<i>Tetrax tetrax</i>	(Linnaeus, 1758)	Gallina prataiola	A11
169	04440	<i>Chlamydotis undulata</i>	(Jacquin, 1784)	Ubara africana	B40
170	04442	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	(J. E. Gray, 1832)	Ubara asiatica	A30
171	04460	<i>Otis tarda</i>	Linnaeus, 1758	Otarda	A20
Charadriiformes					
Haematopodidae					
172	04500	<i>Haematopus ostralegus</i>	Linnaeus, 1758	Beccaccia di mare	A11
Recurvirostridae					
173	04550	<i>Himantopus himantopus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cavaliere d'Italia	A11
174	04560	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Linnaeus, 1758	Avocetta	A11
Burhinidae					
175	04590	<i>Burhinus oedicnemus</i>	(Linnaeus, 1758)	Occhione	A11
Glareolidae					
176	04640	<i>Cursorius cursor</i>	(Latham, 1787)	Corrione biondo	A20
177	04650	<i>Glareola pratincola</i>	(Linnaeus, 1766)	Pernice di mare	A11
178	04670	<i>Glareola nordmanni</i>	Nordmann, 1842	Pernice di mare orientale	A30
Charadriidae					
179	04690	<i>Charadrius dubius</i>	Scopoli, 1786	Corriere piccolo	A11
180	04700	<i>Charadrius hiaticula</i>	Linnaeus, 1758	Corriere grosso	A10
181	04770	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Linnaeus, 1758	Fratino	A11
182	04790	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Lesson, 1826	Corriere di Leschenault	A30
183	04800	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pallas, 1773	Corriere asiatico	A30
184	04820	<i>Charadrius morinellus</i>	Linnaeus, 1758	Piviere tortolino	A11
185	04841	<i>Pluvialis dominica</i>	(Statius Müller, 1776)	Piviere americano	A30
186	04842	<i>Pluvialis fulva</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Piviere orientale	A30
187	04850	<i>Pluvialis apricaria</i>	(Linnaeus, 1758)	Piviere dorato	A10
188	04860	<i>Pluvialis squatarola</i>	(Linnaeus, 1758)	Pivieressa	A10
189	04870	<i>Vanellus spinosus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pavoncella armata	AD30 (17)
190	04910	<i>Vanellus gregarius</i>	(Pallas, 1771)	Pavoncella gregaria	A20
191	04920	<i>Vanellus leucurus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Pavoncella codabianca	A30
192	04930	<i>Vanellus vanellus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pavoncella	A11

continua

Scolopacidae					(18)
193	04960	<i>Calidris canutus</i>	(Linnaeus, 1758)	Piovanello maggiore	A10
194	04970	<i>Calidris alba</i>	(Pallas, 1764)	Piovanello tridattilo	A10
195	05000	<i>Calidris ruficollis</i>	(Pallas, 1776)	Gambecchio collarosso	A30
196	05010	<i>Calidris minuta</i>	(Leisler, 1812)	Gambecchio comune	A10
197	05020	<i>Calidris temminckii</i>	(Leisler, 1812)	Gambecchio nano	A10
198	05040	<i>Calidris minutilla</i>	(Vieillot, 1819)	Gambecchio americano	A30
199	05060	<i>Calidris bairdii</i>	(Coues, 1861)	Gambecchio di Baird	A30
200	05070	<i>Calidris melanotos</i>	(Vieillot, 1819)	Piovanello pettorale	A20
201	05090	<i>Calidris ferruginea</i>	(Pontoppidan, 1763)	Piovanello comune	A10
202	05100	<i>Calidris maritima</i>	(Brünnich, 1764)	Piovanello violetto	A20
203	05120	<i>Calidris alpina</i>	(Linnaeus, 1758)	Piovanello pancianera	A10
204	05140	<i>Limicola falcinellus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Gambecchio frullino	A10
205	05160	<i>Tryngites subruficollis</i>	(Vieillot, 1819)	Piro piro fulvo	A20
206	05170	<i>Philomachus pugnax</i>	(Linnaeus, 1758)	Combattente	A10
207	05180	<i>Lymnocyptes minimus</i>	(Brünnich, 1764)	Frullino	A10
208	05190	<i>Gallinago gallinago</i>	(Linnaeus, 1758)	Beccaccino	A12
209	05200	<i>Gallinago media</i>	(Latham, 1787)	Croccolone	A10
210	05210	<i>Gallinago stenura</i>	(Bonaparte, 1830)	Beccaccino stenuro	A30
211	05270	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	(Say, 1823)	Limnodromo pettorossiccio	A30
212	05290	<i>Scolopax rusticola</i>	Linnaeus, 1758	Beccaccia	A11
213	05320	<i>Limosa limosa</i>	(Linnaeus, 1758)	Pittima reale	A11
214	05340	<i>Limosa lapponica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pittima minore	A10
215	05380	<i>Numenius phaeopus</i>	(Linnaeus, 1758)	Chiurlo piccolo	A10
216	05400	<i>Numenius tenuirostris</i>	Vieillot, 1817	Chiurlottello	A20
217	05410	<i>Numenius arquata</i>	(Linnaeus, 1758)	Chiurlo maggiore	A13
218	05440	<i>Bartramia longicauda</i>	(Bechstein, 1812)	Piro piro codalunga	A30
219	05550	<i>Xenus cinereus</i>	(Güldenstädt, 1775)	Piro piro del Terek	A20
220	05560	<i>Actitis hypoleucos</i>	(Linnaeus, 1758)	Piro piro piccolo	A11
221	05570	<i>Actitis macularia</i>	(Linnaeus, 1766)	Piro piro macchiato	A30
222	05530	<i>Tringa ochropus</i>	Linnaeus, 1758	Piro piro culbianco	A10
223	05450	<i>Tringa erythropus</i>	(Pallas, 1764)	Totano moro	A10
224	05480	<i>Tringa nebularia</i>	(Gunnerus, 1767)	Pantana	A10
225	05600	<i>Tringa semipalmata</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Piro piro semipalmato	A30
226	05510	<i>Tringa flavipes</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Totano zampegiale minore	A30
227	05470	<i>Tringa stagnatilis</i>	(Bechstein, 1803)	Albastrello	A10
228	05540	<i>Tringa glareola</i>	Linnaeus, 1758	Piro piro boschereccio	A10
229	05460	<i>Tringa totanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettegola	A11
230	05610	<i>Arenaria interpres</i>	(Linnaeus, 1758)	Voltapietre	A10
231	05630	<i>Phalaropus tricolor</i>	(Vieillot, 1819)	Falaropo di Wilson	A30
232	05640	<i>Phalaropus lobatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Falaropo beccosottile	A10
233	05650	<i>Phalaropus fulicarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Falaropo beccolargo	A20
Stercorariidae					
234	05660	<i>Stercorarius pomarinus</i>	(Temminck, 1815)	Stercorario mezzano	A10
235	05670	<i>Stercorarius parasiticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Labbo	A10
236	05680	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Vieillot, 1819	Labbo codalunga	A10
237	05690	<i>Stercorarius skua</i>	(Brünnich, 1764)	Stercorario maggiore	A20
Laridae					(21)
238	06040	<i>Pagophila eburnea</i>	(Phipps, 1774)	Gabbiano eburneo	A30
239	05790	<i>Xema sabini</i>	(Sabine, 1819)	Gabbiano di Sabine	A30

continua

La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima

240	06020	<i>Rissa tridactyla</i>	(Linnaeus, 1758)	Gabbiano tridattilo	A10
241	05850	<i>Chroicocephalus genei</i>	(Brème, 1839)	Gabbiano roseo	A11
242	05820	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	(Linnaeus, 1766)	Gabbiano comune	A11
243	05780	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	(Pallas, 1776)	Gabbianello	A10
244	06010	<i>Rhodostethia rosea</i>	(MacGillivray, 1824)	Gabbiano di Ross	A30
245	05760	<i>Larus atricilla</i>	Linnaeus, 1758	Gabbiano sghignazzante	A30
246	05770	<i>Larus pipixan</i>	Wagler, 1831	Gabbiano di Franklin	A30
247	05750	<i>Larus melanocephalus</i>	Temminck, 1820	Gabbiano corallino	A11
248	05880	<i>Larus audouinii</i>	Payraudeau, 1826	Gabbiano corso	A11
249	05730	<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas, 1773	Gabbiano di Pallas	A20
250	05900	<i>Larus canus</i>	Linnaeus, 1758	Gavina	A10
251	05890	<i>Larus delawarensis</i>	Ord, 1815	Gavina americana	A30
252	05910	<i>Larus fuscus</i>	Linnaeus, 1758	Zafferano	A10
253	05920	<i>Larus argentatus</i>	Pontoppidan, 1763	Gabbiano reale nordico	A10
254	05926	<i>Larus michahellis</i>	Naumann, 1840	Gabbiano reale	A11
255	05927	<i>Larus cachinmans</i>	Pallas, 1811	Gabbiano reale pontico	A20
256	05980	<i>Larus glaucoides</i>	Meyer, 1822	Gabbiano d'Islanda	A30
257	05990	<i>Larus hyperboreus</i>	Gunnerus, 1767	Gabbiano glauco	A30
258	06000	<i>Larus marinus</i>	Linnaeus, 1758	Mugnaiaccio	A20
Sternidae					(22)
259	06230	<i>Onychoprion fuscatus</i>	(Linnaeus, 1766)	Sterna scura	B40
260	06240	<i>Sternula albifrons</i>	(Pallas, 1764)	Fratricello	A11
261	06050	<i>Gelochelidon nilotica</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Sterna zampanere	A11
262	06060	<i>Hydroprogne caspia</i>	(Pallas, 1770)	Sterna maggiore	A13
263	06260	<i>Chlidonias hybrida</i>	(Pallas, 1811)	Mignattino piombato	A11
264	06270	<i>Chlidonias niger</i>	(Linnaeus, 1758)	Mignattino comune	A11
265	06280	<i>Chlidonias leucopterus</i>	(Temminck, 1815)	Mignattino alibianche	A11
266	06110	<i>Sterna sandvicensis</i>	Latham, 1787	Beccapesci	A11
267	06090	<i>Sterna bengalensis</i>	Lesson, 1831	Sterna di Rueppell	A11
268	06150	<i>Sterna hirundo</i>	Linnaeus, 1758	Sterna comune	A11
269	06140	<i>Sterna dougallii</i>	Montague, 1813	Sterna di Dougall	A30
270	06160	<i>Sterna paradisaea</i>	Pontoppidan, 1763	Sterna codalunga	A20 (23)
Alcidae					
271	06340	<i>Uria aalge</i>	(Pontoppidan, 1763)	Uria	A30
272	06360	<i>Alca torda</i>	Linnaeus, 1758	Gazza marina	A10
273	06470	<i>Alle alle</i>	(Linnaeus, 1758)	Gazza marina minore	A30
274	06540	<i>Fratercula arctica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pulcinella di mare	A10
Pteroclitiformes					
Pteroclitidae					
275	06590	<i>Pterocles senegallus</i>	(Linnaeus, 1771)	Grandule del Senegal	B40
276	06620	<i>Pterocles alchata</i>	(Linnaeus, 1766)	Grandule	B40
277	06630	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(Pallas, 1773)	Sirratte	A30
Columbiformes					
Columbidae					
278	06650	<i>Columba livia</i>	J. F. Gmelin, 1789	Piccione selvatico	AC11
279	06680	<i>Columba oenas</i>	Linnaeus, 1758	Colombella	A11
280	06700	<i>Columba palumbus</i>	Linnaeus, 1758	Colombaccio	A11
281	06840	<i>Streptopelia decaocto</i>	(Frisvaldszky, 1838)	Tortora dal collare	A11

continua

282	06870	<i>Streptopelia turtur</i>	(Linnaeus, 1758)	Tortora selvatica	A11
283	06890	<i>Streptopelia orientalis</i>	(Latham, 1790)	Tortora orientale	B40
284	06900	<i>Streptopelia senegalensis</i>	(Linnaeus, 1766)	Tortora delle palme	AE22 (24)

Psittaciformes

Psittacidae

285	07120	<i>Psittacula krameri</i>	(Scopoli, 1769)	Parrocchetto dal collare	C11
286	20390	<i>Myiopsitta monachus</i>	(Boddaert, 1783)	Parrocchetto monaco	C11

Cuculiformes

Cuculidae

287	07160	<i>Clamator glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Cuculo dal ciuffo	A11
288	07240	<i>Cuculus canorus</i>	Linnaeus, 1758	Cuculo	A11
289	07270	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	(Wilson, 1811)	Cuculo occhirossi	B40 (25)
290	07280	<i>Coccyzus americanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cuculo americano	A30

Strigiformes

Tytonidae

291	07350	<i>Tyto alba</i>	(Scopoli, 1769)	Barbagianni	A11
-----	-------	------------------	-----------------	-------------	-----

Strigidae

292	07390	<i>Otus scops</i>	(Linnaeus, 1758)	Assiolo	A11
293	07440	<i>Bubo bubo</i>	(Linnaeus, 1758)	Gufo reale	A11
294	07510	<i>Glaucidium passerinum</i>	(Linnaeus, 1758)	Civetta nana	A11
295	07570	<i>Athene noctua</i>	(Scopoli, 1769)	Civetta	A11
296	07610	<i>Strix aluco</i>	Linnaeus, 1758	Allocco	A11
297	07650	<i>Strix uralensis</i>	Pallas, 1771	Allocco degli Urali	A12
298	07670	<i>Asio otus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gufo comune	A11
299	07680	<i>Asio flammeus</i>	(Pontoppidan, 1763)	Gufo di palude	A10
300	07700	<i>Aegolius funereus</i>	(Linnaeus, 1758)	Civetta capogrosso	A11

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

301	07780	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Linnaeus, 1758	Succiacapre	A11
302	07790	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Temminck, 1820	Succiacapre collaroso	B40
303	07810	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	Lichtenstein, 1823	Succiacapre isabellino	A30

Apodiformes

Apodidae

304	07950	<i>Apus apus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rondone comune	A11
305	07960	<i>Apus pallidus</i>	(Shelley, 1870)	Rondone pallido	A11
306	07980	<i>Apus melba</i>	(Linnaeus, 1758)	Rondone maggiore	A11
307	08000	<i>Apus affinis</i>	(J. E. Gray, 1830)	Rondone indiano	A30 (26)

Coraciiformes

Alcedinidae

308	08310	<i>Alcedo atthis</i>	(Linnaeus, 1758)	Martin pescatore	A11
-----	-------	----------------------	------------------	------------------	-----

Meropidae

309	08390	<i>Merops persicus</i>	Pallas, 1773	Gruccione egiziano	A30
310	08400	<i>Merops apiaster</i>	Linnaeus, 1758	Gruccione	A11

continua

Coraciidae

311 08410 *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 Ghiandaia marina A11

Upupidae

312 08460 *Upupa epops* Linnaeus, 1758 Upupa A11

Piciformes

Picidae

313 08480 *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 Torcicollo A11

314 08550 *Picus canus* J. F. Gmelin, 1788 Picchio cenerino A11

315 08560 *Picus viridis* Linnaeus, 1758 Picchio verde A11

316 08630 *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) Picchio nero A11

317 08760 *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore A11

318 08830 *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758) Picchio rosso mezzano A11

319 08840 *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803) Picchio dalmatino A11

320 08870 *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) Picchio rosso minore A11

321 08980 *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) Picchio tridattilo A11

Passeriformes

Alaudidae

322 09560 *Ammomanes cinctura* (Gould, 1839) Allodola del deserto minore A30

323 09580 *Alaemon alaudipes* (Desfontaines, 1789) Allodola beccocurvo A30

324 09590 *Chersophilus duponti* (Vieillot, 1820) Allodola di Dupont A30

325 09610 *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) Calandra A11

326 09620 *Melanocorypha bimaculata* (Ménétries, 1832) Calandra asiatica A30

327 09650 *Melanocorypha leucoptera* (Pallas, 1811) Calandra siberiana A30

328 09660 *Melanocorypha yeltoniensis* (J. R. Forster, 1767) Calandra nera A30

329 09680 *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) Calandrella A11

330 09700 *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820) Calandrina A20

331 09720 *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) Cappellaccia A11

332 09740 *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) Tottavilla A11

333 09760 *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 Allodola A11

334 09780 *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758) Allodola golagialla A20

Hirundinidae

335 09810 *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) Topino A11

336 09910 *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769) Rondine montana A11

337 09920 *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 Rondine A11

338 10010 *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) Balestruccio A11

339 09950 *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) Rondine rossiccia A11 (27)

Motacillidae

340 10020 *Anthus richardi* Vieillot, 1818 Calandro maggiore A10

341 10050 *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758) Calandro A11

342 10080 *Anthus hodgsoni* Richmond, 1907 Prispolone indiano A30

343 10090 *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) Prispolone A11

344 10110 *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758) Pispola A13

345 10120 *Anthus cervinus* (Pallas, 1811) Pispola golarossa A10

346 10140 *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758) Spioncello A11

347 10142 *Anthus petrosus* (Montagu, 1798) Spioncello marino A30

348 10144 *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771) Spioncello del Pacifico A30

349 10170 *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 Cutrettola A11

continua

350	10180	<i>Motacilla citreola</i>	Pallas, 1776	Cutrettola testagiolla orientale	A20
351	10190	<i>Motacilla cinerea</i>	Tunstall, 1771	Ballerina gialla	A11
352	10200	<i>Motacilla alba</i>	Linnaeus, 1758	Ballerina bianca	A11
Bombycillidae					
353	10480	<i>Bombycilla garrulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Beccofrusone	A20
Cinclidae					
354	10500	<i>Cinclus cinclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo	A11
Troglodytidae					
355	10660	<i>Troglodytes troglodytes</i>	(Linnaeus, 1758)	Scricciolo	A11
Prunellidae					
356	10840	<i>Prunella modularis</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera scopaiola	A11
357	10860	<i>Prunella montanella</i>	(Pallas, 1776)	Passera scopaiola asiatica	B40
358	10940	<i>Prunella collaris</i>	(Scopoli, 1769)	Sordone	A11
Turdidae					
359	10950	<i>Cercotrichas galactotes</i>	(Temminck, 1820)	Usignolo d' Africa	A20
360	10990	<i>Erithacus rubecula</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettiroso	A11
361	11030	<i>Luscinia luscinia</i>	(Linnaeus, 1758)	Usignolo maggiore	A10
362	11040	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C. L. Brehm, 1831	Usignolo	A11
363	11050	<i>Luscinia calliope</i>	(Pallas, 1776)	Calliope	B40
364	11060	<i>Luscinia svecica</i>	(Linnaeus, 1758)	Pettazzurro	A13
365	11130	<i>Tarsiger cyanurus</i>	(Pallas, 1773)	Codazzurro	A30
366	11170	<i>Irania gutturalis</i>	(Guérin-Ménéville, 1843)	Pettiroso golabianca	A30 (28)
367	11210	<i>Phoenicurus ochruros</i>	(S. G. Gmelin, 1774)	Codiroso spazzacamino	A11
368	11220	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	(Linnaeus, 1758)	Codiroso comune	A11
369	11270	<i>Phoenicurus moussieri</i>	(Olphe-Galliard, 1852)	Codiroso algerino	A30
370	11370	<i>Saxicola rubetra</i>	(Linnaeus, 1758)	Stiaccino	A11
371	11390	<i>Saxicola torquatus</i>	(Linnaeus, 1766)	Saltimpalo	A11
372	11440	<i>Oenanthe isabellina</i>	(Temminck, 1829)	Culbianco isabellino	A10
373	11460	<i>Oenanthe oenanthe</i>	(Linnaeus, 1758)	Culbianco	A11
374	11470	<i>Oenanthe pleschanka</i>	(Lepechin, 1770)	Monachella dorsonero	A30
375	11480	<i>Oenanthe hispanica</i>	(Linnaeus, 1758)	Monachella	A11
376	11500	<i>Oenanthe deserti</i>	(Temminck, 1825)	Monachella del deserto	A20 (29)
377	11580	<i>Oenanthe leucura</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Monachella nera	A34
378	11620	<i>Monticola saxatilis</i>	(Linnaeus, 1766)	Codirossone	A11
379	11660	<i>Monticola solitarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Passero solitario	A11
380	11700	<i>Zoothera dauma</i>	(Latham, 1790)	Tordo dorato	A30
381	11710	<i>Zoothera sibirica</i>	(Pallas, 1776)	Tordo siberiano	BD40 (30)
382	11760	<i>Catharus guttatus</i>	(Pallas, 1811)	Tordo di Pallas	B40
383	11770	<i>Catharus ustulatus</i>	(Nuttall, 1840)	Tordo di Swainson	B40
384	11780	<i>Catharus minimus</i>	(Lafresnaye, 1848)	Tordo di Baird	B40
385	11860	<i>Turdus torquatus</i>	Linnaeus, 1758	Merlo dal collare	A11
386	11870	<i>Turdus merula</i>	Linnaeus, 1758	Merlo	A11
387	11950	<i>Turdus obscurus</i>	J. F. Gmelin, 1789	Tordo oscuro	A20
388	11962	<i>Turdus eunomus</i>	Temminck, 1831	Cesena fosca	A30
389	11961	<i>Turdus naumanni</i>	Temminck, 1820	Cesena di Naumann	A30 (31)
390	11972	<i>Turdus atrogularis</i>	Jarocki, 1819	Tordo golanera	A20 (32)
391	11971	<i>Turdus ruficollis</i>	Pallas, 1776	Tordo golarossa	A30

continua

La lista CISO-COI degli Uccelli italiani – Parte prima

392	11980	<i>Turdus pilaris</i>	Linnaeus, 1758	Cesena	A11
393	12000	<i>Turdus philomelos</i>	C. L. Brehm, 1831	Tordo bottaccio	A11
394	12010	<i>Turdus iliacus</i>	Linnaeus, 1766	Tordo sassello	A13
395	12020	<i>Turdus viscivorus</i>	Linnaeus, 1758	Tordela	A11
Sylviidae					
396	12200	<i>Cettia cetti</i>	(Temminck, 1820)	Usignolo di fiume	A11
397	12260	<i>Cisticola juncidis</i>	(Rafinesque, 1810)	Beccamoschino	A11
398	12360	<i>Locustella naevia</i>	(Boddaert, 1783)	Forapaglie macchiettato	A10
399	12370	<i>Locustella fluviatilis</i>	(Wolf, 1810)	Locustella fluviatile	A30
400	12380	<i>Locustella luscinioides</i>	(Savi, 1824)	Salciaiola	A11
401	12410	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	(Temminck, 1823)	Forapaglie castagnolo	A11
402	12420	<i>Acrocephalus paludicola</i>	(Vieillot, 1817)	Pagliarolo	A10
403	12430	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	(Linnaeus, 1758)	Forapaglie comune	A11
404	12470	<i>Acrocephalus agricola</i>	(Jerdon, 1845)	Cannaiola di Jerdon	A30
405	12480	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth, 1849	Cannaiola di Blyth	A30
406	12500	<i>Acrocephalus palustris</i>	(Bechstein, 1798)	Cannaiola verdognola	A11
407	12510	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	(Hermann, 1804)	Cannaiola comune	A11
408	12530	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cannareccione	A11
409	12550	<i>Hippolais pallida</i>	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Canapino pallido	A30 (33)
410	12560	<i>Hippolais caligata</i>	(Lichtenstein, 1823)	Canapino asiatico	A30
411	12580	<i>Hippolais olivetorum</i>	(Strickland, 1837)	Canapino levantino	B40
412	12590	<i>Hippolais icterina</i>	(Vieillot, 1817)	Canapino maggiore	A10
413	12600	<i>Hippolais polyglotta</i>	(Vieillot, 1817)	Canapino comune	A11
414	12770	<i>Sylvia atricapilla</i>	(Linnaeus, 1758)	Capinera	A11
415	12760	<i>Sylvia borin</i>	(Boddaert, 1783)	Beccafico	A11
416	12730	<i>Sylvia nisoria</i>	(Bechstein, 1795)	Bigia padovana	A11
417	12740	<i>Sylvia curruca</i>	(Linnaeus, 1758)	Bigiarella	A11
418	12720	<i>Sylvia hortensis</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Bigia grossa	A11
419	12700	<i>Sylvia deserti</i>	(Loche, 1858)	Sterpazzola del deserto	A30
420	12750	<i>Sylvia communis</i>	Latham, 1787	Sterpazzola	A11
421	12640	<i>Sylvia conspicillata</i>	Temminck, 1820	Sterpazzola della Sardegna	A11
422	12620	<i>Sylvia undata</i>	(Boddaert, 1783)	Magnanina comune	A11
423	12610	<i>Sylvia sarda</i>	Temminck, 1820	Magnanina sarda	A11
424	12690	<i>Sylvia rueppelli</i>	Temminck, 1823	Bigia di Rueppell	A20
425	12680	<i>Sylvia melanothorax</i>	Tristram, 1872	Occhiocotto di Cipro	A30 (34)
426	12650	<i>Sylvia cantillans</i>	(Pallas, 1764)	Sterpazzolina comune	A11 (35)
427	12652	<i>Sylvia subalpina</i>	Temminck, 1820	Sterpazzolina di Moltoni	A11 (36)
428	12670	<i>Sylvia melanocephala</i>	(J. F. Gmelin, 1789)	Occhiocotto	A11
429	12660	<i>Sylvia mystacea</i>	Ménétries, 1832	Occhiocotto di Ménétries	A30 (37)
430	12950	<i>Phylloscopus borealis</i>	(Blasius, 1858)	Lùì boreale	B40
431	12980	<i>Phylloscopus proregulus</i>	(Pallas, 1811)	Lùì di Pallas	A30
432	13000	<i>Phylloscopus inornatus</i>	(Blyth, 1842)	Lùì forestiero	A20
433	13002	<i>Phylloscopus humei</i>	(Brooks, 1878)	Lùì di Hume	A30
434	13010	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	(Radde, 1863)	Lùì di Radde	A30
435	13030	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	(Blyth, 1842)	Lùì scuro	A30
436	13070	<i>Phylloscopus bonelli</i>	(Vieillot, 1819)	Lùì bianco	A11
437	13072	<i>Phylloscopus orientalis</i>	(C. L. Brehm, 1855)	Lùì bianco orientale	A30 (38)
438	13080	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	(Bechstein, 1793)	Lùì verde	A11
439	13110	<i>Phylloscopus collybita</i>	(Vieillot, 1817)	Lùì piccolo	A11
440	13120	<i>Phylloscopus trochilus</i>	(Linnaeus, 1758)	Lùì grosso	A10
441	13140	<i>Regulus regulus</i>	(Linnaeus, 1758)	Regolo	A11

continua

442	13150	<i>Regulus ignicapilla</i>	(Temminck, 1820)	Fiorrancino	A11	
Muscicapidae						
443	13350	<i>Muscicapa striata</i>	(Pallas, 1764)	Pigliamosche	A11	
444	13430	<i>Ficedula parva</i>	(Bechstein, 1792)	Pigliamosche pettirosso	A20	
445	13470	<i>Ficedula semitorquata</i>	(Homeyer, 1885)	Balia caucasica	A20	
446	13480	<i>Ficedula albicollis</i>	(Temminck, 1815)	Balia dal collare	A11	
447	13490	<i>Ficedula hypoleuca</i>	(Pallas, 1764)	Balia nera	A14	
Timaliidae						
448	13640	<i>Panurus biarmicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Basettino	A11	
449	13700	<i>Paradoxornis webbianus</i>	(Gould, 1852)	Panuro di Webb	C11	(39)
450	14070	<i>Leiothrix lutea</i>	(Scopoli, 1786)	Usignolo del Giappone	C11	
Aegithalidae						
451	14370	<i>Aegithalos caudatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Codibugnolo	A11	
Paridae						
452	14620	<i>Cyanistes caeruleus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cinciarella	A11	(40)
453	14622	<i>Cyanistes teneriffae</i>	(Lesson, 1831)	Cinciarella algerina	A11	(41)
454	14640	<i>Parus major</i>	Linnaeus, 1758	Cinciallegra	A11	
455	14540	<i>Lophophanes cristatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia dal ciuffo	A11	
456	14610	<i>Periparus ater</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia mora	A11	
457	14410	<i>Poecile lugubris</i>	(Temminck, 1820)	Cincia dalmatina	B40	
458	14420	<i>Poecile montanus</i>	(Conrad, 1827)	Cincia alpestre	A11	(42)
459	14400	<i>Poecile palustris</i>	(Linnaeus, 1758)	Cincia bigia	A11	
Sittidae						
460	14790	<i>Sitta europaea</i>	Linnaeus, 1758	Picchio muratore	A11	
Tichodromidae						
461	14820	<i>Tichodroma muraria</i>	(Linnaeus, 1766)	Picchio muraiolo	A11	(43)
Certhiidae						
462	14860	<i>Certhia familiaris</i>	Linnaeus, 1758	Rampichino alpestre	A11	
463	14870	<i>Certhia brachydactyla</i>	C. L. Brehm, 1820	Rampichino comune	A11	
Remizidae						
464	14900	<i>Remiz pendulinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Pendolino	A11	
Oriolidae						
465	15080	<i>Oriolus oriolus</i>	(Linnaeus, 1758)	Rigogolo	A11	
Laniidae						
466	15130	<i>Lanius cristatus</i>	Linnaeus, 1758	Averla bruna	A30	
467	15140	<i>Lanius isabellinus</i>	Hemprich & Ehrenberg, 1833	Averla isabellina	A20	
468	15150	<i>Lanius collurio</i>	Linnaeus, 1758	Averla piccola	A11	
469	15190	<i>Lanius minor</i>	J. F. Gmelin, 1788	Averla cenerina	A11	
470	15200	<i>Lanius excubitor</i>	Linnaeus, 1758	Averla maggiore	A10	
471	15203	<i>Lanius meridionalis</i>	Temminck, 1820	Averla meridionale	A20	
472	15230	<i>Lanius senator</i>	Linnaeus, 1758	Averla capirossa	A11	

continua

Corvidae

473	15390	<i>Garrulus glandarius</i>	(Linnaeus, 1758)	Ghiandaia	A11
474	15490	<i>Pica pica</i>	(Linnaeus, 1758)	Gazza	A11
475	15570	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	(Linnaeus, 1758)	Nocciolaia	A11
476	15580	<i>Pyrrhcorax graculus</i>	(Linnaeus, 1766)	Gracchio alpino	A11
477	15590	<i>Pyrrhcorax pyrrhcorax</i>	(Linnaeus, 1758)	Gracchio corallino	A11
478	15600	<i>Corvus monedula</i>	Linnaeus, 1758	Taccola	A11
479	15630	<i>Corvus frugilegus</i>	Linnaeus, 1758	Corvo comune	A13 (44)
480	15671	<i>Corvus corone</i>	Linnaeus, 1758	Cornacchia nera	A11
481	15673	<i>Corvus cornix</i>	Linnaeus, 1758	Cornacchia grigia	A11 (45)
482	15720	<i>Corvus corax</i>	Linnaeus, 1758	Corvo imperiale	A11

Sturnidae

483	15830	<i>Sturnus unicolor</i>	Temminck, 1820	Storno nero	A11
484	15820	<i>Sturnus vulgaris</i>	Linnaeus, 1758	Storno	A11
485	15840	<i>Pastor roseus</i>	(Linnaeus, 1758)	Storno roseo	A13 (46)

Passeridae

486	15910	<i>Passer domesticus</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera europea	A11 (48)
487	15920	<i>Passer hispaniolensis</i>	(Temminck, 1820)	Passera sarda	A11
488	15980	<i>Passer montanus</i>	(Linnaeus, 1758)	Passera mattugia	A11
489	16040	<i>Petronia petronia</i>	(Linnaeus, 1766)	Passera lagia	A11
490	16110	<i>Montifringilla nivalis</i>	(Linnaeus, 1766)	Fringuello alpino	A11

Estrildidae

491	20250	<i>Amandava amandava</i>	(Linnaeus, 1758)	Bengalino comune	C11
-----	-------	--------------------------	------------------	------------------	-----

Fringillidae

492	16360	<i>Fringilla coelebs</i>	Linnaeus, 1758	Fringuello	A11
493	16380	<i>Fringilla montifringilla</i>	Linnaeus, 1758	Peppola	A13
494	16400	<i>Serinus serinus</i>	(Linnaeus, 1766)	Verzellino	A11
495	16490	<i>Carduelis chloris</i>	(Linnaeus, 1758)	Verdone	A11
496	16530	<i>Carduelis carduelis</i>	(Linnaeus, 1758)	Cardellino	A11
497	16440	<i>Carduelis citrinella</i>	(Pallas, 1764)	Venturone alpino	A11 (49)
498	16442	<i>Carduelis corsicana</i>	(Koenig, 1899)	Venturone corso	A11 (50)
499	16540	<i>Carduelis spinus</i>	(Linnaeus, 1758)	Lucherino	A11
500	16600	<i>Carduelis cannabina</i>	(Linnaeus, 1758)	Fanello	A11
501	16620	<i>Carduelis flavirostris</i>	(Linnaeus, 1758)	Fanello nordico	A30
502	16630	<i>Carduelis flammea</i>	(Linnaeus, 1758)	Organetto	A11 (51)
503	16650	<i>Loxia leucoptera</i>	J. F. Gmelin, 1789	Crociere fasciato	A20
504	16660	<i>Loxia curvirostra</i>	Linnaeus, 1758	Crociere	A11
505	16680	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Borkhausen, 1793	Crociere delle pinete	A30
506	16760	<i>Bucanetes githagineus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Trombettiere	A20
507	16790	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(Pallas, 1770)	Ciuffolotto scarlatto	A10
508	16990	<i>Pinicola enucleator</i>	(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto delle pinete	A30
509	17100	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	(Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto	A11
510	17170	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	(Linnaeus, 1758)	Frosone	A11

Emberizidae

511	18470	<i>Calcarius lapponicus</i>	(Linnaeus, 1758)	Zigolo della Lapponia	A20
512	18500	<i>Plectrophenax nivalis</i>	(Linnaeus, 1758)	Zigolo delle nevi	A10
513	18560	<i>Emberiza leucocephalos</i>	S. G. Gmelin, 1771	Zigolo golarossa	A10

continua

514	18570	<i>Emberiza citrinella</i>	Linnaeus, 1758	Zigolo giallo	A11
515	18580	<i>Emberiza cirulus</i>	Linnaeus, 1766	Zigolo nero	A11
516	18600	<i>Emberiza cia</i>	Linnaeus, 1766	Zigolo muciatto	A11
517	18660	<i>Emberiza hortulana</i>	Linnaeus, 1758	Ortolano	A11
518	18680	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar, 1826	Ortolano grigio	A30
519	18730	<i>Emberiza rustica</i>	Pallas, 1776	Zigolo boschereccio	A20
520	18740	<i>Emberiza pusilla</i>	Pallas, 1776	Zigolo minore	A20
521	18760	<i>Emberiza aureola</i>	Pallas, 1773	Zigolo dal collare	A30 (52)
522	18770	<i>Emberiza schoeniclus</i>	(Linnaeus, 1758)	Migliarino di palude	A11
523	18800	<i>Emberiza bruniceps</i>	Brandt, 1841	Zigolo testaranciata	A20
524	18810	<i>Emberiza melanocephala</i>	Scopoli, 1769	Zigolo capinero	A11
525	18820	<i>Emberiza calandra</i>	Linnaeus, 1758	Strillozzo	A11
Icteridae					
526	18970	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	(Linnaeus, 1758)	Bobolink	A30

NOTE

Le variazioni o gli aggiornamenti qui di seguito segnalati, quando non sono accompagnati da un'esplicita citazione bibliografica, si riferiscono a modifiche rispetto alla precedente versione della lista, pubblicata on-line nel sito Ciso-Coi.

- (1) Taxon da ritenersi naturalizzato.
- (2) Recentemente *A. f. serrirostris* viene considerata da alcuni autori come specie a sé stante, comprendente *A. f. rossicus* come sottospecie, ed accettata con questo trattamento nelle liste di Olanda e Stati Uniti (cfr. Banks *et al.* 2007).
- (3) Un numero relativamente elevato di segnalazioni si riferisce ad individui di origine non selvatica (categoria E).
- (4) Variati la categoria AERC e lo status riproduttivo.
- (5) L'attribuzione alla categoria D si riferisce alle segnalazioni post-1950.
- (6) Aggiornato lo status generale.
- (7) Permangono incertezze sulla vitalità, o almeno sulla continuità riproduttiva, della piccola popolazione toscana.
- (8) Modificata la denominazione specifica (cfr. Sangster *et al.* 2005).
- (9) Taxon elevato da D30 (cfr. Jiguet *et al.* 2008).
- (10) Taxon elevato da D30; variata l'attribuzione specifica, con *schistacea* come sottospecie, in accordo con la maggior parte delle liste di riferimento (*contra* del Hoyo 1992 e Helbig in Bauer *et al.* 2005).
- (11) Ancora controversa l'attribuzione generica (cfr. AERC TAC 2003b, Jiguet *et al.* 2007).

- (12) Ancora controversa l'attribuzione generica (cfr. AERC TAC 2003b).
- (13) L'aggiunta della categoria C e la variazione dello status generale sono dovute alle segnalazioni di soggetti provenienti dalla popolazione recentemente naturalizzata in Francia (cfr. CAF 2007).
- (14) Il genere *Aquila* ora ingloba anche *Hieraaetus* (cfr. Sangster *et al.* 2005).
- (15) Aggiornato lo status generale.
- (16) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Bricchetti *et al.* 2008).
- (17) Un numero relativamente elevato di segnalazioni si riferisce ad individui ritenuti di origine non selvatica (categoria E).
- (18) Variata la sequenza di parte delle specie all'interno della famiglia (cfr. Sangster *et al.* 2007).
- (19) Aggiornato lo status generale.
- (20) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Janni e Fracasso 2009).
- (21) Variati alcuni nomi di genere e la sequenza delle specie nella famiglia (cfr. Sangster *et al.* 2007); per gli Stati Uniti la AOU (cfr. Banks *et al.* 2008), oltre ai nuovi generi qui riportati, adotta per *L. atricilla* e *L. pipixcan* il genere *Leucophaeus*.
- (22) Variati alcuni nomi di genere e la sequenza delle specie nella famiglia (cfr. Sangster *et al.* 2005, 2007).
- (23) Aggiornato lo status generale.
- (24) Aggiornati lo status generale e quello riproduttivo.
- (25) Corretta la denominazione specifica (cfr. Knox *et al.* 2008).
- (26) Aggiornato da B40 (cfr. Bricchetti e Occhiato 2007).
- (27) Variati: denominazione del genere e descrittore della specie (cfr. Sangster *et al.* 2005, 2007).

- (28) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Brichetti e Occhiato 2007).
- (29) Aggiornato lo status generale.
- (30) L'attribuzione alla categoria D si riferisce a segnalazioni post 1950.
- (31) Largamente condivisa la separazione dalla specie precedente come taxon a sé stante (cfr. Dickinson 2003, del Hoyo 2005, Knox *et al.* 2008).
- (32) Largamente condivisa la separazione dalla specie successiva come taxon a sé stante (cfr. Dickinson 2003, del Hoyo 2005, Knox *et al.* 2008).
- (33) Tenendo anche conto della recente separazione tra *H. pallida* e *H. opaca*, alcune delle segnalazioni post 1950 non sufficientemente documentate vanno attribuite a *Hippolais* sp.
- (34) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Brichetti e Occhiato 2005).
- (35) Variato il nome italiano.
- (36) Taxon elevato da sottospecie del precedente a specie a sé stante e variata la denominazione specifica (cfr. Baccetti *et al.* 2007, Brambilla *et al.* 2008).
- (37) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Brichetti *et al.* 2008).
- (38) Specie nuova per la lista italiana (cfr. Janni e Fracasso 2009).
- (39) Recenti analisi hanno evidenziato l'omogeneità genetica dell'unica popolazione italiana, attribuibile a *P. webbianus*, ma comprendente individui fenotipicamente riconducibili per lo più a *P. alphonsianus*, da considerarsi perciò taxon conspecifico del precedente (cfr. Galimberti 2006).
- (40) Variate la sequenza delle specie ed alcune denominazioni di genere (cfr. Sangster *et al.* 2005).
- (41) Mantenuta la separazione specifica *contra* del Hoyo *et al.* 2007 (cfr. Päckert e Martens 2008).
- (42) Variata la desinenza del nome della specie (Cfr. David e Gosselin 2008 *contra* Sangster *et al.* 2007).
- (43) Variato il nome della famiglia (cfr. del Hoyo *et al.* 2008).
- (44) Variato lo status riproduttivo (cfr. Brichetti e Occhiato 2005).
- (45) Taxon dalla posizione sistematica ancora dibattuta ma elevato da sottospecie del precedente a specie a sé stante in accordo con la maggior parte delle liste di riferimento.
- (46) Modificata la sequenza delle specie (cfr. Knox *et al.* 2008).
- (47) Modificata la denominazione generica (cfr. Knox *et al.* 2008).
- (48) Non ancora chiarita la posizione sistematica delle popolazioni *italiae* - *brutius* - *maltae* mantenute provvisoriamente all'interno di *P. domesticus* (con il nome di "Passera d'Italia", mentre quello di "Passera oltremontana" va riservato alle altre popolazioni di *P. domesticus*).
- (49) Modificata la denominazione generica (cfr. Knox *et al.* 2008).
- (50) Modificata la denominazione generica (cfr. Knox *et al.* 2008).
- (51) Comprende anche il taxon *cabaret* il cui trattamento come specie a sé stante è ancora dibattuto.
- (52) Variato lo status generale.

Ringraziamenti – Ringraziamo per la collaborazione, i suggerimenti o le critiche costruttive Fausto Barbagli, Giovanni Boano, Pierandrea Brichetti, Mauro Brunetti, Carlo Catoni, Andrea Corso, Pierre-André Crochet, Camilla Gotti, Andrew Harrop, Ottavio Janni, Davide Licheri, Alessandro Micheli, Bruno Massa, Ugo Mellone, Sergio Nissardi, Adam Rowlands, Luciano Ruggieri, Giacomo Sgorlon, Franco Trave e Carlo Violani.

BIBLIOGRAFIA

AERC TAC 2003a. AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Palearctic region, with distributional notes on subspecies - 15th Draft. Pubblicato on-line, <http://www.aerc.be>.

AERC TAC 2003b. AERC TAC's taxonomic recommendations (14th draft). Pubblicato on-line, <http://www.aerc.be>.

Baccetti N, Massa B, Violani C 2007. Proposed synonymy of *Sylvia cantillans moltonii* Orlando, 1937, with *Sylvia cantillans subalpina* Temminck, 1820. Bulletin of the British Ornithologists' Club 127: 107-110.

Banks RC, Chesser RT, Cicero C, Dunn JL, Kratter AW, Lovette IJ, Rasmussen PC, Remsen Jr JV, Rising JD, Stotz DF 2007.

Forty-eighth supplement to the American Ornithologists' Union *Check-list of North American birds*. Auk 124: 1109-1115.

Banks RC, Chesser RT, Cicero C, Dunn JL, Kratter AW, Lovette IJ, Rasmussen PC, Remsen Jr JV, Rising JD, Stotz DF, Winker K 2008. Forty-ninth supplement to the American Ornithologists' Union *Check-list of North American birds*. Auk 125: 758-768.

Barthel PH, Helbig AJ 2006. Checklist of the birds of Germany. DO-G, Limicola Verlag, Einbeck.

Bauer HG, Bezzel E, Fiedler W 2005. Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. 2. Aufl., AULA-Verlag, Wiebelsheim.

Brambilla M, Vitulano S, Spina F, Baccetti N, Gargallo G, Fabri E, Guidali F, Randi E 2008. A molecular phylogeny of the *Sylvia cantillans* complex: Cryptic species within the Mediterranean basin. Molecular Phylogenetics and Evolution 48: 451-472.

Brichetti P, Fracasso G, Janni O 2008. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 21. Avocetta 33: 82-86.

Brichetti P, Occhiato D 2005. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 19. Avocetta 29: 93-107.

Brichetti P, Occhiato D 2007. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 20. Avocetta 31: 75-88.

- CAF (Commission de l'Avifaune Française) 2007. Liste officielle des oiseaux de France. *Ornithos* 14: 234-246.
- Clements JF 2000. *Birds of the world: a checklist*, 5th edition. Ibis Publishing Company, Vista, California.
- David N, Gosselin M 2008. Grammatical gender of *Poecile* and *Leptopoeile*. *Dutch Birding* 30: 19.
- del Hoyo J, Elliott A, Christie DA (eds) 1992. *Handbook of the birds of the world*. Vol. 1. Lynx Ed., Barcelona.
- del Hoyo J, Elliott A, Christie DA (eds) 2005. *Handbook of the birds of the world*. Vol. 10. Lynx Ed., Barcelona.
- del Hoyo J, Elliott A, Christie DA (eds) 2007. *Handbook of the birds of the world*. Vol. 12. Lynx Ed., Barcelona.
- del Hoyo J, Elliott A, Christie DA (eds) 2008. *Handbook of the birds of the world*. Vol. 13. Lynx Ed., Barcelona.
- Dickinson EC (ed) 2003. *The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world*. C. Helm, London.
- Dudley S, Gee M, Kehoe C, Melling TM & BOURC 2006. *The British List: A checklist of birds of Britain (7th edition)*. Ibis 148: 526-563.
- Galimberti A 2006. Dilemma tassonomico in specie alloctone invasive: il caso di *Paradoxornis webbianus* e *P. alphonsianus* nella Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia (VA). Tesi di laurea specialistica, Università degli studi di Milano Bicocca.
- Gill F, Wright M 2006. *Birds of the world: recommended English names*. Princeton Univ. Press, Princeton.
- Janni O, Fracasso G 2009. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 22. *Avocetta* 33.
- Jiguet F, Crochet P-A, Dubois PJ, Le Maréchal P, Pons J-M, Yésou P 2007. Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2006-2007. *Ornithos* 14: 108-115.
- Jiguet F, Doxa A, Robert M 2008. The origin of out-of-range pelicans in Europe: wild bird dispersal or zoo escapes? *Ibis* 150: 606-618.
- Knox AG, Collinson JM, Helbig AJ, Parkin DT, Sangster G L 2002. Taxonomic recommendations for British birds. *Ibis* 144: 707-710.
- Knox AG, Collinson JM, Parkin DT, Sangster G, Svensson L 2008. Taxonomic recommendations for British birds: fifth report. *Ibis* 150: 833-835.
- Päckert M, Martens J 2008. Taxonomic pitfalls in tits - comments on the *Paridae* chapter of the *Handbook of the Birds of the World*. *Ibis* 150: 829-831.
- Sangster G, Collinson JM, Helbig AJ, Knox AG, Parkin DT 2004. Taxonomic recommendations for British birds: second report. *Ibis* 146: 153-157.
- Sangster G, Collinson JM, Helbig AJ, Knox AG, Parkin DT 2005. Taxonomic recommendations for British birds: third report. *Ibis* 147: 821-826.
- Sangster G, Collinson JM, Knox AG, Parkin DT, Svensson L 2007. Taxonomic recommendations for British birds: Fourth report. *Ibis* 149: 853-857.
- Violani C, Barbagli F, 2006. Repertorio italiano dei nomi degli uccelli - parte prima: *Struthioniformes* - *Psittaciformes*. *Avocetta* 30 (numero speciale): 5-65.
- Volet B 2006. Elenco degli uccelli della Svizzera. *Der ornithologische Beobachter* 103: 271-294.
- Volet B, Schmid H, Winkler R 2000. Elenco degli uccelli della Svizzera. *Der ornithologische Beobachter* 97: 79-103.
- Voous KH 1977. List of recent holarctic bird species. *British Ornithologists' Union, Tring*.

